

LEXIQUE

CNO

LANGAGE

PRÉCISION



DÉFINITION

CLARTÉ

OCCLUSODONTOLOGIE



Lexique

2001 - 2026

Collège National d'Occlusodontologie

Lexique

Responsable : Jean-Daniel ORTHLIEB

Commissions de Terminologie

2001

Gilles BARALE
André DARTHEZ
Bernard FLEITER
Marie-Pascale HIPPOLYTE
Christian KNELLESEN
Jean-François LAURET
Jean-Daniel ORTHLIEB
Paul PIONCHON
Maurice ROCHE

Illustrations : Jean-François LAURET

2025 - 2026

Daniel BROCARD
Nicolas CHATEAU
Bernard FLEITER
Nicolas FOUGERONT
Armelle MANIÈRE
Jean-Daniel ORTHLIEB
Paul SAULUE
Mathilde SAVIGNAT

Illustrations : Mathilde SAVIGNAT
Jean-Daniel ORTHLIEB
Daniel BROCARD

Les termes du lexique de 2001 sont progressivement complétés et transformés avec de nouvelles définitions.

Les nouvelles définitions sont suivies d'une référence avec l'année de leur élaboration

mise en page : Daniel Brocard

sommaire

ABAISSEMENT MANDIBULAIRE (mouvement d')
ABRASION DENTAIRE
ADAPTATION (def. 2026)
AILE DE BENNETT
ANALYSE OCCLUSALE
ANGLE CUSPIDIEN
ANGLE CUSPIDIEN ABSOLU
ANGLE CUSPIDIEN RELATIF
ANGLE DE BENNETT
ANGLE DE FISCHER
ANGLE E.H.
APPAREIL (def. 2026)
APPAREIL MANDUCATEUR
ARC (facial) DE LOCALISATION
ARC (facial) DE TRANSFERT
ARC GOTHIQUE DE GYSI
ARCON
ARÊTE CUSPIDIENNE
ARTICULATEUR
ARTICULATION DENTO-DENTAIRE
ARTICULATION TEMPORO MANDIBULAIRE
ARTICULÉ DENTAIRE
ATTELLE DE FIXATION
ATTRITION
AXE BICONDYLIEN
AXE CHARNIÈRE
AXE INSTANTANÉ DE ROTATION
AXIOGRAPHIE
BALKWILL F.H.B.
BALLARD C.S.
BENNETT N.G.
BOITIER CONDYLIEN
BONWILL W.G.A.
BORD INCISIF
BROCA P.
BRUXISME
BUTÉE ANTÉRIEURE
CALE DE DÉCOMPRESSION
CALE(ou vis) DE PROPULSION
CAMPER P.
CENTRIFUGE
CENTRIPÈTE
CINÉMATIQUE CONDYLIENNE
CINÉMATIQUE (def.2025)
CINÉMATIQUE MANDIBULAIRE
CINGULUM
CIRCUMDUCTION
CIRE AJOUTÉE (technique de la)
CLAQUEMENT ARTICULAIRE
CLASSES D'ANGLE (def. 2026)
CLASSIFICATION DE BALLARD
CLUTCH
CONDYLE MANDIBULAIRE
CONDYLE NON TRAVAILLANT
CONDYLE ORBITANT
CONDYLE PIVOTANT
CONDYLE TEMPORAL
CONDYLE TRAVAILLANT
CONDYLIEN (point)
CONDYLOGRAPHIE
CONTACT OCCLUSAL
CONTACT PROXIMAL (point de)
CONTRO-LATÉRAL
CORONÉ
COSTEN J.B.
CÔTÉ ÉQUILIBRANT
CÔTÉ MASTIQUANT
CÔTÉ NON MASTIQUANT
CÔTÉ NON TRAVAILLANT
CÔTÉ TRAVAILLANT
COURBE DE SPEE
COURBES DE WILSON
CRÉPITATION ARTICULAIRE
CRÊTE CUSPIDIENNE
CRÊTE MARGINALE
CUSPIDE
CUSPIDE D'APPUI
CUSPIDÉ(E)
CUSPIDE GUIDE
CUSPIDE SUPPORT
CYCLE DE MASTICATION
DENTALÉ
DENTITION
DENTURE
DENTURE MIXTE
DÉPLACEMENT LATÉRAL
DÉPLACEMENT TRANSVERSAL
DÉRANGEMENT INTERNE

DÉSORDRES CRANIO-MANDIBULAIRES (D.C.M.)
DÉSORDRES TEMPORO MANDIBULAIRES (D.T.M)
DIAGRAMME DE POSSELT
DIDUCTION (mouvement de)
DIMENSION VERTICALE DE REPOS (D.V.R.)
DIMENSION VERTICALE D'OCCLUSION (D.V.O.)
DISQUE ARTICULAIRE
DOUBLE BASE ENGRENÉE
DOULEUR CRANIOFACIALE (def.2026)
DOULEUR (def.2026)
DOULEUR NEUROPATHIQUE (def.2026)
DOULEUR NOCICEPTIVE (def.2026)
DOULEUR NOCIPLASTIQUE (def.2026)
DOULEUR OROFACIALE (def.2026)
DOULEUR OROFACIALE (def.2026)
DOULEUR PROJETEE (def.2026)
DOULEUR REFEREE (def.2026)
DRAPEAU (technique du)
DYNAMIQUE (def.2025)
DYSESTHESIE OCCLUSALE (def. 2026)
DYSFONCTION
DYSFONCTIONNEMENT (def.2026)
DYSFONCTIONNEMENTS DE L'APPAREIL MANDUCATEUR (DAM) (def.2025)
DYSFONCTIONNEMENTS TEMPOROMANDIBULAIRES (DTM) (def.2025)
DYSPRAXIE (def. 2026)
ÉDUCATION THERAPEUTIQUE (def. 2026)
ÉLÉVATION MANDIBULAIRE (mouvement d')
EMBRASURE
ÉMINENCE TEMPORALE
ENTRÉE DE CYCLE DE MASTICATION
ÉROSION DENTAIRE
ESPACE INTER-OCCLUSAL DE REPOS
ESPACE LIBRE DE THOMPSON
EXAMEN OCCLUSAL
FACE
FACE DISTALE
FACE LINGUALE
FACE MÉSIALE
FACE OCCLUSALE
FACE PALATINE
FACE PROXIMALE
FACE TRITURANTE
FACETTE D'USURE
FACE VESTIBULAIRE
FERMETURE BUCCALE
FERREIN A.
FISCHER R.F.T.
FONCTION CANINE
FONCTION (def. 2026)
FONCTION GROUPE
FONCTIONNEMENT
FONCTION OCCLUSALE
FONCTION ORALE
FOSSE OCCLUSALE
FOSSETTE MARGINALE
GNATHOGRAMME DE BALKWILL
GNATHOSONIES
GOUTTIÈRE OCCLUSALE
GYSI A.
HAUTEUR CUSPIDIENNE
HOMOLATÉRAL
HYPERCONDYLIE
HYPOCONDYLIE
INCISION MANDIBULAIRE (point)
INCISURE
INCOORDINATION CONDYLO-DISCALE
INDENTATION
INDICATEUR DE POSITION MANDIBULAIRE
INFRACLUSIE
INFRACLUSION
INFRAGNATHIE
INFRA-ORBITAIRE {point)
INOCCLUSION
INTERCUSPIDATION
INTERCUSPIDIE
INTERFÉRENCE OCCLUSALE
INTERLIGNE ARTICULAIRE
JIG DE LUCIA
LATÉRAL
LATÉRALISATION (mouvement de)
LATÉRALITÉ (mouvement de)
LATÉROCLUSION (mouvement de)
LIGNE DE PLUS GRAND CONTOUR
LOBE CUSPIDIEN
LOBULE INCISIF
LOCALISATEUR D'AXE CHARNIÈRE
LUCIA V.
LUXATION CONDYLO-TEMPORALE

MACROCONDYLIE
MALOCCLUSION
MANDIBULOGRAPHIE
MANDUCATION
MARQUEUR D'OCCLUSION
MASTICATION
MASTIQUANT (côté)
MÉDIAL
MÉDIALISATION (mouvement de)
MÉDIOCLUSION {mouvement de)
MÉNISQUE
MICROCONDYLIE
MODÈLE
MONTAGE DIRECTEUR
MOULAGE
MOUVEMENT AXIAL TERMINAL
MOUVEMENT D'ABAISSEMENT MANDIBULAIRE
MOUVEMENT DE BENNETT
MOUVEMENT DE DIDUCTION
MOUVEMENT DE FERMETURE
MOUVEMENT DE FERREIN
MOUVEMENT DE LATÉRALISATION
MOUVEMENT DE LATÉROCLUSION
MOUVEMENT D'ÉLÉVATION MANDIBULAIRE
MOUVEMENT DE MÉDIALISATION
MOUVEMENT DE MÉDIOCLUSION
MOUVEMENT DE PROCLUSION
MOUVEMENT DE PROPULSION
MOUVEMENT DE PROTRACTION
MOUVEMENT DE RÉTROCLUSION
MOUVEMENT DE RÉTROPULSION
MOUVEMENT DE RÉTROTRACTION
MOUVEMENT D'OUVERTURE
MOUVEMENT ÉQUILIBRANT
MOUVEMENT MANDIBULAIRE
MOUVEMENT NON TRAVAILLANT
MOUVEMENTS LIMITES
MOUVEMENT TRANSVERSAL
MOUVEMENT TRANSVERSAL IMMÉDIAT
MOUVEMENT TRANSVERSAL PROGRESSIF
MOUVEMENT TRAVAILLANT
MUSCLES MANDUCATEURS
MUSCLES MASTICATEURS
NOCICEPTION (def. 2026)
NON MASTIQUANT (côté)
NORMOCCLUSION
OCCLUSEUR
OCCLUSION CENTRÉE
OCCLUSION DE CONVENANCE
OCCLUSION DENTAIRE
OCCLUSION D'INTERCUSPIDATION MAXIMALE
OCCLUSION D'INTERCUSPIDIE MAXIMALE (O.I.M.)
OCCLUSION DYSFONCTIONNELLE
OCCLUSION EN RELATION CENTRÉE (O.R.C)
OCCLUSION FONCTIONNELLE
OCCLUSION HABITUELLE
OCCLUSION MUTUELLEMENT PROTÉGÉE
OCCLUSION PATHOGÈNE
OCCLUSODONTIE
OCCLUSODONTOLOGIE
OCCLUSOGRAMME
ORTHÈSE INTEROCCLUSALE
ORTHOFONCTION (def. 2026)
OUVERTURE BUCCALE (mouvement d')
PAN CUSPIDIEN
PANTOGRAPHE
PANTOGRAPHIE
PARAFONCTION
PARAFONCTION ORALE (def. 2026)
PATHOFONCTION (def. 2026)
PENTE CANINE
PENTE CONDYLIENNE
PENTE CONDYLIENNE (def. 2026)
PENTE CUSPIDIENNE
PENTE CUSPIDIENNE ABSOLUE
PENTE CUSPIDIENNE RELATIVE
PENTE INCISIVE
PLAN AXIO-ORBITAIRE
PLAN DE CAMPER
PLAN DE FRANCFORT
PLAN D'OCCLUSION
PLAN OCCLUSO-CORONAIRE
POINT DE CONTACT
POINT D'ÉMERGENCE (de l'axe charnière)
POINTE CUSPIDIENNE
PORION
POSITION DE REPOS
POSITION D'INOCCLUSION PHYSIOLOGIQUE
POSITION D'INTERCUSPIDATION MAXIMALE
POSITION D'INTERCUSPIDIE MAXIMALE

POSITION LIMITE
POSSELT U.
POSTURE DE REPOS
PRAXIE (def. 2026)
PRÉMATURITÉ OCCLUSALE
PROCESSUS CONDYLAIRE
PROCESSUS CORONOÏDE
PROCLUSION (mouvement de)
PROPULSION (mouvement de)
PROSTHION
PROTECTION CANINE
RECOUVREMENT
RELATION CENTREE (def.2025)
RÉTROCLUSION (mouvement de)
RÉTROPULSION (mouvement de)
RÉTROTRACTION (mouvement de)
SIGNE
SILLON DENTAIRE
SILLON DE STUART
SILLON MARGINAL
SILLON PRINCIPAL
SILLON SECONDAIRE
SIMULATEUR (de mouvements mandibulaires)
SOMESTHESIE (def. 2026)
SORTIE DE CYCLE DE MASTICATION
SOUS-OCCLUSION
SOUS-ORBITAIRE (point)
SPEE F.
SQUELETTE CRANIO-FACIAL
STATIQUE (def.2025)
STIMULUS NOCICEPTIF (def. 2026)
STRESS (def. 2026)
STUART C.
SUPRACLUSIE
SUPRACLUSION
SUROCCLUSION
SURPLOMB
SYMPTOME
SYNDROME
SYNDROME ALGO-DYSFONCTIONNEL DE L'APPAREIL MANDUCATEUR (S.A.D.A.M.)
SYNDROME DE COSTEN
SYSTÈME ARTICULAIRE
SYSTEME (def. 2026)
SYSTÈME DENTAIRE
SYSTÈME NEURO-MUSCULAIRE (crâniofacial)
TABLE INCISIVE
TABLE OCCLUSALE
TÊTE CONDYLAIRE
THOMPSON
TIGE INCISIVE
TRAGION
TRAGUS
TRAJECTOIRE CONDYLIENNE
TRAJECTOIRE INCISIVE
TRAJET CONDYLIEN
TRAJET INCISIF
TRIANGLE DE BONWILL
TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION (TDC) (def.2026)
TUBERCULE ARTICULAIRE (du temporal)
TUBERCULE DENTAIRE
VERSANT CUSPIDIEN
VISAGE
WILSON G.H.

RUBRIQUES

DEFINITIONS EN COURS)

ÉDUCATION THERAPEUTIQUE (def. 2026)
SOMESTHESIE (def. 2026)
ADAPTATION (def. 2026)
ORTHOFONCTION (def. 2026)
DOULEUR OROFACIALE (def.2026)
DOULEUR CRANIOFACIALE (def.2026)
DYSESTHESIE OCCLUSALE (def. 2026)
PENTE CONDYLIENNE (def. 2026)

DOULEURS

DOULEUR (def.2026)
DOULEUR NEUROPATHIQUE (def.2026)
DOULEUR NOCICEPTIVE (def.2026)
DOULEUR NOCIPLASTIQUE (def.2026)
DOULEUR PROJETEE (def.2026)
DOULEUR REFEREE (def.2026)
DOULEUR OROFACIALE (def.2026)
NOCICEPTION (def. 2026)
STIMULUS NOCICEPTIF (def. 2026)
STRESS (def. 2026)

MOUVEMENTS MANDIBULAIRES

ABAISSEMENT MANDIBULAIRE (mouvement d')
CONDYLE NON TRAVAILLANT
CONDYLE ORBITANT
CONDYLE PIVOTANT
CONDYLE TRAVAILLANT
CÔTÉ MASTIQUANT
CÔTÉ NON MASTIQUANT
CÔTÉ NON TRAVAILLANT
CÔTÉ TRAVAILLANT
DÉPLACEMENT LATÉRAL
DÉPLACEMENT TRANSVERSAL
DIDUCTION (mouvement de)
ÉLÉVATION MANDIBULAIRE (mouvement d')
FERMETURE BUCCALE
FONCTION CANINE
FONCTION GROUPE
GNATHOGRAMME DE BALKWILL
LATÉRALISATION (mouvement de)
LATÉROCLUSION (mouvement de)
LATÉRALITÉ (mouvement de)
MOUVEMENT D'ABAISSEMENT MANDIBULAIRE
MOUVEMENT D'ÉLÉVATION MANDIBULAIRE
MOUVEMENT D'OUVERTURE
MOUVEMENT DE BENNETT
MOUVEMENT DE DIDUCTION
MOUVEMENT DE FERMETURE
MOUVEMENT DE FERREIN
MOUVEMENT DE LATÉRALISATION
MOUVEMENT DE LATÉROCLUSION
MOUVEMENT DE MÉDIALISATION
MOUVEMENT DE MÉDIOCLUSION
MOUVEMENT DE PROCLUSION
MOUVEMENT DE PROPULSION
MOUVEMENT DE PROTRACTION
MOUVEMENT DE RÉTROCLUSION
MOUVEMENT DE RÉTROPULSION
MOUVEMENT DE RÉTROTRACTION
MOUVEMENT MANDIBULAIRE
MOUVEMENT TRANSVERSAL
MOUVEMENT TRANSVERSAL IMMÉDIAT
MOUVEMENT TRANSVERSAL PROGRESSIF
MOUVEMENT TRAVAILLANT
MOUVEMENTS LIMITES
OUVERTURE BUCCALE (mouvement d')
PROCLUSION (mouvement de)
PROPULSION (mouvement de)
PROTECTION CANINE
RÉTROCLUSION (mouvement de)
RÉTROPULSION (mouvement de)
RÉTROTRACTION (mouvement de)
TRAJECTOIRE CONDYLIENNE
TRAJECTOIRE INCISIVE
TRAJET CONDYLIEN
TRAJET INCISIF

TERMINOLOGIE ANATOMIQUE

APPAREIL (def. 2026)
APPAREIL MANDUCATEUR
ARTICULATION TEMPORO MANDIBULAIRE
CENTRIFUGE
CENTRIPÈTE
CLASSES D'ANGLE (def. 2026)
CLASSIFICATION DE BALLARD
CONDYLE MANDIBULAIRE

CONTRO-LATÉRAL
DISQUE ARTICULAIRE
FACE
HOMOLATÉRAL
INFRA-ORBITAIRE {point)
INTERLIGNE ARTICULAIRE
LATÉRAL
MÉDIAL
MUSCLES MANDUCATEURS
MUSCLES MASTICATEURS
PORION
PROCESSUS CONDYLAIRE
PROCESSUS CORONOÏDE
PROSTHION
SOUS-ORBITAIRE (point)
SQUELETTE CRANIO-FACIAL
SYSTEME (def. 2026)
SYSTÈME ARTICULAIRE
SYSTÈME DENTAIRE
SYSTÈME NEURO-MUSCULAIRE (crâniofacial)
TRAGION
TRAGUS
TUBERCULE ARTICULAIRE (du temporal)

FONCTIONS

CIRCUMDUCTION
CYCLE DE MASTICATION
DIAGRAMME DE POSSELT
DIMENSION VERTICALE D'OCCLUSION (D.V.O.)
DIMENSION VERTICALE DE REPOS (D.V.R.)
ENTRÉE DE CYCLE DE MASTICATION
FONCTION (def. 2026)
FONCTIONNEMENT
FONCTION ORALE
MANDUCATION
MASTICATION
MASTIQUANT (côté)
OCCLUSION CENTRÉE
OCCLUSION D'INTERCUSPIDATION MAXIMALE
OCCLUSION D'INTERCUSPIDIE MAXIMALE (O.I.M.)
OCCLUSION DE CONVENANCE
OCCLUSION DENTAIRE
OCCLUSION EN RELATION CENTRÉE (O.R.C)
OCCLUSION HABITUELLE
OCCLUSION FONCTIONNELLE
POSITION D'INOCCLUSION PHYSIOLOGIQUE
POSITION D'INTERCUSPIDATION MAXIMALE
POSITION D'INTERCUSPIDIE MAXIMALE
POSITION DE REPOS
POSITION LIMITE
POSTURE DE REPOS
PRAXIE (def. 2026)
SORTIE DE CYCLE DE MASTICATION

DYSFONCTIONS (APPAREIL MANDUCATEUR)

CLAQUEMENT ARTICULAIRE
CRÉPITATION ARTICULAIRE
DÉRANGEMENT INTERNE
DÉSORDRES CRANIO-MANDIBULAIRES (D.C.M.)
DÉSORDRES TEMPORO MANDIBULAIRES (D.T.M)
DYSFONCTION
DYSFONCTIONNEMENT (def.2026)
DYSFONCTIONNEMENTS TEMPOROMANDIBULAIRES (DTM) (def.2025)
DYSPRAXIE (def. 2026)
GNATHOSONIES
INCOORDINATION CONDYLO-DISCALE
LUXATION CONDYLO-TEMPORALE
PATHOFONCTION (def. 2026)
TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION (TDC) (def.2026)

PARAFONCTION

BRUXISME
PARAFONCTION
PARAFONCTION ORALE (def. 2026)

MÉCANIQUE - CONCEPTS

CINÉMATIQUE (def.2025)
CINÉMATIQUE CONDYLIENNE
CINÉMATIQUE MANDIBULAIRE
DYNAMIQUE (def.2025)
CÔTÉ ÉQUILIBRANT
MÉDIALISATION (mouvement de)
MÉDIOCLUSION {mouvement de)
MOUVEMENT ÉQUILIBRANT
NON MASTIQUANT (côté)
MOUVEMENT NON TRAVAILLANT
NORMOCCLUSION

OCCLUSION MUTUELLEMENT PROTÉGÉE
STATIQUE (def.2025)

DIAGNOSTIC-TRAITEMENT

ANALYSE OCCLUSALE
AXIOGRAPHIE
BUTÉE ANTÉRIEURE
CIRE AJOUTÉE (technique de la)
EXAMEN OCCLUSAL
GOUTTIÈRE OCCLUSALE
INDENTATION
INDICATEUR DE POSITION MANDIBULAIRE
JIG DE LUCIA
MARQUEUR D'OCCLUSION
MODÈLE
MONTAGE DIRECTEUR
MOULAGE
MOUVEMENT AXIAL TERMINAL
OCCLUSOGRAMME
ORTHÈSE INTEROCCLUSALE
RELATION CENTREE (def.2025)

PATHOLOGIE

HYPERCONDYLIE
HYPOCONDYLIE
INFRAGNATHIE
MACROCONDYLIE
MICROCONDYLIE
SYNDROME

FONCTION-DYSFONCTION (OCCLUSALES)

INTERFÉRENCE OCCLUSALE
MALOCCLUSION
OCCLUSION DYSFONCTIONNELLE
OCCLUSION PATHOGÈNE
PRÉMATURITÉ OCCLUSALE
SOUS-OCCLUSION
SUPRACLUSIE
SUPRACLUSION
SUROCCLUSION

LÉSIONS NON CARIEUSES

ABRASION DENTAIRE
ATTRITION
ÉROSION DENTAIRE
FACETTE D'USURE

SIMULATEURS

AILE DE BENNETT
ANGLE DE BENNETT
ANGLE DE FISCHER
ARC (facial) DE LOCALISATION
ARC (facial) DE TRANSFERT
ARC GOTHIQUE DE GYSI
ARCON
ARTICULATEUR
ATTELLE DE FIXATION
AXE BICONDYLIEN
AXE CHARNIÈRE
AXE INSTANTANÉ DE ROTATION
BOITIER CONDYLIEN
CALE(ou vis) DE PROPULSION
CALE DE DÉCOMPRESSION
CLUTCH
CONDYLIEN (point)
CONDYLOGRAPHIE
DOUBLE BASE ENGRENÉE
DRAPEAU (technique du)
LOCALISATEUR D'AXE CHARNIÈRE
MANDIBULOGRAPHIE
OCCLUSEUR
PANTOGRAPHE
PANTOGRAPHIE
PENTE CANINE
PENTE CONDYLIENNE
PENTE CUSPIDIENNE
PENTE CUSPIDIENNE ABSOLUE
PENTE CUSPIDIENNE RELATIVE
PENTE INCISIVE
PLAN AXIO-ORBITAIRE
PLAN D'OCCLUSION
PLAN DE CAMPER
PLAN DE FRANCFORT
PLAN OCCLUSO-CORONAIRE
POINT D'ÉMERGENCE (de l'axe charnière)
SIMULATEUR (de mouvements mandibulaires)
TABLE INCISIVE

TIGE INCISIVE
TRIANGLE DE BONWILL

MORPHOLOGIE DENTAIRE

ANGLE CUSPIDIEN
ANGLE CUSPIDIEN ABSOLU
ANGLE CUSPIDIEN RELATIF
ARÊTE CUSPIDIENNE
ARTICULATION DENTO-DENTAIRE
ARTICULÉ DENTAIRE
BORD INCISIF
CINGULUM
CONTACT OCCLUSAL
CONTACT PROXIMAL (point de)
CRÊTE CUSPIDIENNE
CRÊTE MARGINALE
CUSPIDE
CUSPIDE D'APPUI
CUSPIDE GUIDE
CUSPIDE SUPPORT
CUSPIDÉ(E)
FACE DISTALE
FACE LINGUALE
FACE MÉSIALE
FACE OCCLUSALE
FACE PALATINE
FACE PROXIMALE
FACE TRITURANTE
FACE VESTIBULAIRE
FOSSE OCCLUSALE
FOSSETTE MARGINALE
HAUTEUR CUSPIDIENNE
INCISURE
LIGNE DE PLUS GRAND CONTOUR
LOBE CUSPIDIEN
LOBULE INCISIF
PAN CUSPIDIEN
POINT DE CONTACT
POINTE CUSPIDIENNE
SILLON DENTAIRE
SILLON MARGINAL
SILLON PRINCIPAL
SILLON SECONDAIRE
SILLON DE STUART
TABLE OCCLUSALE
TUBERCULE DENTAIRE
VERSANT CUSPIDIEN

TERMES IMPROPRES OU OBSOLÈTES

CONDYLE TEMPORAL
CORONÉ
DYSFONCTIONNEMENTS DE L'APPAREIL MANDUCATEUR (DAM) (def.2025)
ÉMINENCE TEMPORALE
INCISION MANDIBULAIRE (point)
MÉNISQUE
SYNDROME ALGO-DYSFONCTIONNEL DE L'APPAREIL MANDUCATEUR (S.A.D.A.M.)
SYNDROME DE COSTEN
TÊTE CONDYLAIRE

ORGANISATION DES ARCADES

COURBE DE SPEE
COURBES DE WILSON
DENTALÉ
EMBRASURE
ESPACE INTER-OCCLUSAL DE REPOS
ESPACE LIBRE DE THOMPSON
FONCTION OCCLUSALE
INFRACLUSIE
INFRACLUSION
INOCCLUSION
INTERCUSPIDATION
INTERCUSPIDIE
RECOUVREMENT
SURPLOMB

A CLASSER

DENTITION
DENTURE
DENTURE MIXTE
OCCLUSODONTIE
OCCLUSODONTOLOGIE
SIGNE
SYMPTOME
VISAGE

PERSONNALITÉS

ANGLE E.H.
BALKWILL F.H.B.
BALLARD C.S.
BENNETT N.G.
BONWILL W.G.A.
BROCA P.
CAMPER P.
COSTEN J.B.
FERREIN A.
FISCHER R.F.T.
GYSI A.
LUCIA V.
POSSELT U.
SPEE F.
STUART C.
THOMPSON
WILSON G.H.

DEFINITIONS EN COURS)

ÉDUCATION THERAPEUTIQUE (def. 2026)

Etymol : du latin educare (ex-ducere) = faire sortir de, guider hors de, et du grec therapeutikos = qui prend soin, qui guérit

L'éducation thérapeutique du patient est une méthode d'apprentissage centrée sur la personne qui vise, par une auto prise en charge, à faciliter son adhésion aux traitements et améliorer sa qualité de vie.

Voir : Alliance thérapeutique, TCC

Angl : THERAPEUTIC EDUCATION

SOMESTHESIE (def. 2026)

Etymol : Sôma le corps, aisthêsis sensation-perception

Sensibilité du corps excluant celle des organes sensoriels (vision, audition, olfaction, gustation).
Elle comprend l'extéroception (tact, pression, chaud, froid…), la proprioception (musculaire, tendineuse…), l'intéroception (viscères…) et la nociception.

Angl : SOMATOSENSORY (somatosensoriel)

ADAPTATION (def. 2026)

Etymol : du latin « adaptatio », équivalent du dérivé de « adapter »

Réaction (biologique, mécanique ou psychologique) en réponse à une contrainte, maintenant des capacités physiologiques mais générant quelques modifications structurelles, fonctionnelles ou comportementales dans les nouvelles conditions.

Remarque : on nomme également « adaptation » le résultat de ce processus.

Termes en relation : tolérance, décompensation, maladaptation

Angl.: ADAPTATION

ORTHOFONCTION (def. 2026)

Etymol : du latin functio = accomplissement, « ortho » = droit ou correct

Fonction idéale au plan académique

Remarque : modèle théorique rarement observé naturellement.

Termes en relation : fonction, dysfonction, pathofonction, eufonction

Angl. : ORTHOFUNCTION

DOULEUR OROFACIALE (def.2026)

Etymol : du latin doloris = douleur

Douleur au niveau de la cavité orale, de la face, voire étendue vers le crâne

Remarque : le terme de douleur orofaciale décrit les douleurs ressenties essentiellement dans les territoires innervés par le trijumeau. Toutefois « douleur orofaciale », stricto sensu, n'inclut pas les céphalées qui sont crâniennes. Ainsi le terme de « douleur céphalique » (Head Pain - HP) a été récemment proposé.*

** Boucher Y. and all Prevalence of orofacial and head pain: an umbrella review of systematic reviews. Journal of Oral & Facial Pain and Headache,2024,38(3):1-14.*

Terme en relation : douleur cranio-faciale

Angl. : OROFACIAL PAIN

DOULEUR CRANIOFACIALE (def.2026)

Etymol : du latin doloris = douleur

Douleur s'exprimant dans la région céphalique (face et crâne)

Remarque : Synonyme de douleur céphalique. Le terme de douleur orofaciale est plus communément utilisé à la place de douleur craniofaciale/douleur céphalique, plus justes anatomiquement.

Termes en relation : Douleur Orofaciale, Douleur céphalique

Angl. : CRANIOFACIAL PAIN

DYSESTHESIE OCCLUSALE (def. 2026)

Etymol. : préfixe grec dis=de façon défectueuse

La dysesthésie occlusale est un trouble chronique somatoforme caractérisé par un inconfort occlusal non clairement identifiable, en rapport avec un état d'hypervigilance occlusale

Angl : OCCLUSAL DYSESTHESIA

PENTE CONDYLIENNE (def. 2026)

Angle formé par la projection du trajet condylien dans le plan sagittal avec un plan horizontal de référence lors des diductions mandibulaires.

Remarques :

- *Différents plans horizontaux peuvent être utilisés : Plan Axio-orbitaire, Plan de Francfort, Plan NHP (Natural Head Posture),..*
- *La mesure est habituellement établie sur 5 mm de translation*
- *L'utilisation des trajets en diduction au lieu des trajets en propulsion permet d'individualiser les valeurs droite et gauche.*

Angl : SAGITTAL CONDYLAR INCLINATION (SCI)



DOULEURS

DOULEUR (def.2026)

Etymol : du latin doloris = douleur
Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle (IASP).

Remarque : Elle comprend trois groupes de composantes : somatique et sensori-discriminative, émotionnelle et comportementale, cognitive et évaluative.

Terme en relation : Nociception

Angl : PAIN

Type de douleur	Caractéristiques	Exemples	Traitement
Nociceptive	Douleur due à une lésion, inflammation ou dégénérescence des tissus	Pulpite, traumatisme, brûlure, ostéoarthrite, maladie rhumatismale	Antalgique topique, paracétamol, AINS, AIS, opioïdes
Neuropathique	Douleur due à une lésion ou blessure du tissu nerveux	Radiculopathie, neuropathie diabétique, neuropathie chimio-induite	Traitement topique ou local, médication systémique (gabapentine, prégabaline, antidépresseur tricycliques)
Nociplastique	Douleur due à une sensibilisation du système nerveux (amplification du signal, défaut d'inhibition ou les deux)	Troubles musculo-squelettiques chroniques (lombalgie, DTM), fibromyalgie	Prise en charge multimodale

Tableau : Types de douleurs selon les mécanismes

Thapa R, Ang D. Nociplastic pain: A practical guide to chronic pain management in the primary care setting. Cleve Clin J Med. 2025 Apr 1;92(4):236-247. doi: 10.3949 ccjm.92a.24101. PMID: 40169217.

DOULEUR NEUROPATHIQUE (def.2026)

Etymol: du latin doloris = douleur, neuro = relatif aux nerfs et pathie = maladie, souffrance
Douleur survenant suite à une lésion ou une maladie du système somesthésique. Elle peut être d'origine périphérique ou centrale.

Remarque : somesthésique est utilisé en français, pour l'anglais somatosensory (somatosensoriel)

Termes en relation : somesthésie

Angl : NEUROPATHIC PAIN

DOULEUR NOCICEPTIVE (def.2026)

Etymol : du latin doloris = douleur, nocere = nuire et captere = recevoir»
Douleur due à une lésion réelle ou potentielle des tissus non neuronaux. Elle est due à l'excitation des voies nociceptives non altérées (d'après IASP).

Remarque : la douleur inflammatoire en est un cas extrême où la lésion et l'inflammation tissulaire peuvent entraîner une sensibilisation périphérique voire centrale.

Terme en relation :Sensibilisation

Angl : NOCICEPTIVE PAIN

DOULEUR NOCIPLASTIQUE (def.2026)

Etymol: du latin doloris « douleur », nocere « nuire », plasticus «relatif au modelage »
Douleur provenant d'une altération de la nociception malgré l'absence de signes :
- de dommage tissulaire induisant l'activation des nocicepteurs périphériques
- ou de maladie ou lésion du système nerveux somatosensoriel (IASP).

Remarque : elle est due au phénomène de sensibilisation centrale et à un dysfonctionnement des voies nerveuses du système nerveux central avec une amplification du signal douloureux et/ou une diminution de l'action des voies inhibitrices descendantes

(Thapa R, Ang D. Nociplastic pain: A practical guide to chronic pain management in the primary care setting. Cleve Clin J Med. 2025 Apr 1;92(4):236-247).

Terme obsolète : douleur dysfonctionnelle.

Angl: NOCIPLASTIC PAIN

DOULEUR PROJETEE (def.2026)

Etymol : Du latin « doloris », projetée ??
Douleur due à une perturbation le long du trajet d'une fibre nerveuse ou de ses connexions centrales, ressentie dans le territoire du nerf périphérique.

Angl : PROJECTED PAIN

DOULEUR REFEREE (def.2026)

Etymol. : du latin « doloris », référée??
Douleur issue des tissus profonds, ressentie en dehors ou à distance de la lésion causale.
Elle est due à la convergence d'afférences nociceptives primaires issues de territoires corporels différents sur le même neurone de deuxième ordre.

Remarques : la région « site » de la douleur, où elle est ressentie, est diffrente de la région « source » de la douleur provenant des tissus profonds (muscles, articulations, viscères, pulpe dentaire). La palpation déclenchante peut reproduire la douleur référée.

Angl : REFERRED PAIN



DOULEUR OROFACIALE (def.2026)

Etymol : du latin doloris = douleur
Douleur au niveau de la cavité orale, de la face, voire étendue vers le crâne

Remarque : le terme de douleur orofaciale décrit les douleurs ressenties essentiellement dans les territoires innervés par le trijumeau. Toutefois « douleur orofaciale », stricto sensu, n'inclut pas les céphalées qui sont crâniennes. Ainsi le terme de « douleur céphalique » (Head Pain - HP) a été récemment proposé.*

** Boucher Y. and all Prevalence of orofacial and head pain: an umbrella review of systematic reviews. Journal of Oral & Facial Pain and Headache,2024,38(3):1-14.*

Terme en relation : douleur cranio-faciale

Angl. : Orofacial Pain

NOCICEPTION (def. 2026)

Etymol. : du latin « nocere » (nuire) « capere » (recevoir)
Évènements dans le système nerveux périphérique ou central associés au traitement des signaux électriques provoqués par des stimuli qui menacent ou lèsent les tissus.

Remarques : la plupart de ces évènements sont aussi observés sous anesthésie générale et peuvent être étudiés expérimentalement chez l'animal anesthésié. Ainsi, il peut y avoir nociception sans douleur. Inversement toutes douleurs, telle la douleur d'origine émotionnelle, n'est pas nécessairement d'origine nociceptive

(d'après Mense et Gerwin modifié. Muscle pain. Berlin Heidlberg: Springer-Verlag. 2010).

Termes en relation : Douleur - Stimulus nociceptif

Angl : NOCICEPTION

STIMULUS NOCICEPTIF (def. 2026)

Stimulus qui lèse effectivement ou peut léser potentiellement des tissus normaux (IASP).

Terme en relation : Nociception

Angl : NOXIOUS STIMULUS : a stimulus that is damaging or threatens damage to normal tissues (IASP).

STRESS (def. 2026)
etymol : du latin stringere : rendre raide, serrer, presser
Le stress est une sensation courante qui survient quand nous sommes sous pression et nous donne l'impression d'être dépassés par les événements ou incapables d'y faire face.

Remarque : À petites doses, le stress peut se révéler bénéfique et motiver à atteindre certains objectifs. À l'inverse, un stress trop intense semblant échapper à notre contrôle est susceptible d'impacter notre humeur, notre bien-être physique et mental et nos relations avec les autres.

Terme en relation : anxiété
Angl. : STRESS

MOUVEMENTS MANDIBULAIRES

ABAISSEMENT MANDIBULAIRE (mouvement d')
Voir « Mouvement d'abaissement mandibulaire »
Angl. : JAW OPENING

CONDYLE NON TRAVAILLANT
Voir « Condyle orbitant »
Angl. : NONWORKING SIDE CONDYLE

CONDYLE ORBITANT
(loc) Etymol. : du grec kondulos = articulatio ; du latin orbita, décrire un mouvement circulaire autour de.
Condyle mandibulaire situé du côté non mastiquant pendant la diduction.
Angl. : ORBITING CONDYLE



CONDYLE PIVOTANT
(loc.) Etymol.: du grec kondulos = articulation ; de l'ancien français pivot= se trémousser.
Condyle mandibulaire situé du côté travaillant pendant la diduction.
Angl.: PIVOTING CONDYLE



CONDYLE TRAVAILLANT
Voir « Condyle pivotant »
Angl. • WORKING SIDE CONDYLE

CÔTÉ MASTIQUANT
(loc.)
Côté où s'effectue la mastication.
Syn. Côté travaillant.
Angl. : CHEWING OR WORKING SIDE



CÔTÉ NON MASTIQUANT
(loc.)
Côté opposé à celui où s'effectue la mastication.
Syn. Côté non travaillant.
Angl. : NONWORKING SIDE



CÔTÉ NON TRAVAILLANT
Voir « Côté non mastiquant »
Angl. : NONWORKING SIDE

CÔTÉ TRAVAILLANT
Voir « Côté mastiquant »
Angl. : WORKING SIDE

DÉPLACEMENT LATÉRAL
Voir « Mouvement transversal »
Angl. : SIDESHIFT

DÉPLACEMENT TRANSVERSAL
Voir « Mouvement transversal »

DIDUCTION (mouvement de)
Voir « Mouvement de diduction »

ÉLÉVATION MANDIBULAIRE (mouvement d')
(loc.)
Voir « Mouvement d'élévation mandibulaire »
Angl. : MANDIBLE CLOSING MOVEMENT

FERMETURE BUCCALE
(loc.)
Fait référence à la fermeture de la cavité orale avec ou sans élévation mandibulaire.
Angl . : MOUTH CLOSURE

FONCTION CANINE
(loc.) Etymol. : du latin functio = accomplissement et caninus = propre au chien.
Prise en charge par une canine maxillaire du seul contact dento-dentaire au cours d'un mouvement de diduction.
Angl : CUSPID GUIDANCE

FONCTION GROUPE
(loc.)
Prise en charge par plusieurs dents maxillaires des contacts dento-dentaires au cours d'un mouvement de diduction.
Angl. : GROUP FUNCTION

GNATHOGRAMME DE BALKWILL
(loc.) Etymol.: du grec gnathos = mâchoire, et gramma = trace laissée, iscription, dessin, croquis
Projection d'un point mandibulaire médian sur un plan horizontal lors des trajectoires de diduction avec guidage dentaire.
Voir « Arc gothique de Gysi ».
Angl. : BALKWILL'S GNATHOGRAM

LATÉRALISATION (mouvement de)
Voir à « Mouvement de latéralisation »

LATÉROCLUSION (mouvement de)
Voir à « Mouvement de latéroclusion »

LATÉRALITÉ (mouvement de)
Voir « Mouvement de diduction »
Angl. : DIDUCTION

MOUVEMENT D'ABAISSEMENT MANDIBULAIRE
(loc.)
Mouvement de la mandibule, à direction verticale, qui l'éloigne de l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.).
Angl. : MANDIBULAR OPENING MOVEMENT

MOUVEMENT D'ÉLÉVATION MANDIBULAIRE
(!oc.)
Mouvement de la mandibule, à direction verticale, qui la rapproche de l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.).
Angl. : MANDIBULAR CLOSING MOVEMENT

MOUVEMENT D'OUVERTURE
(loc.)
Voir « Mouvement d'abaissement mandibulaire »
Angl. : OPENING MOVEMENT

MOUVEMENT DE BENNETT
(loc.)
Déplacement transversal de la mandibule observé essentiellement au niveau du condyle pivotant lors d'un mouvement de diduction.
Voir « Mouvement transversal »
Angl. • BENNETT'S SIDE SHIFT



MOUVEMENT DE DIDUCTION
(n.f.) Etymol. : du latin movere= mouvoir, préfixe dis- = dans des directions différentes, dans des sens divers, et ducere = conduire, amener
Mouvement asymétrique de la mandibule, à direction transversale, au cours duquel l'incision se déplace depuis l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.) vers une position latérale, puis y revient.
Angl. : DIDUCTION

MOUVEMENT DE FERMETURE
Voir « Mouvement d'élévation mandibulaire »
Angl. : CLOSING MOVEMENT

MOUVEMENT DE FERREIN
Voir « Mouvement de rétraction »

MOUVEMENT DE LATÉRALISATION

Mouvement mandibulaire,caractérisant le côté qui s'éloigne du plan sagittal médian, avec ou sans contact dentodentaire lors de la diduction.
N.B. : Le côté opposé effectue un mouvement de médialisation.
Angl. : LATEROTRUSION



MOUVEMENT DE LATÉROCLUSION

Mouvement mandibulaire, centrifuge du côté mastiquant, avec contacts dentodentaires lors de la diduction à partir de l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.).
N.B. : L'inverse est le mouvement de médioclusion.
Angl. : LATEROTRUSION



MOUVEMENT DE MÉDIALISATION

Mouvement mandibulaire, caractérisant le côté qui se rapproche du plan sagittal médian, avec ou sans contacts dento-dentaires lors de la diduction.
N.B. : Le côté opposé effectue un mouvement de latéralisation.

Angl. : MEDIOTRUSION



MOUVEMENT DE MÉDIOCLUSION

Mouvement mandibulaire, centripète du côté mastiquant, avec contacts dento dentaires lors de la diduction en direction de !'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.).
N.B. : L'inverse est le mouvement de latéroclusion.

Angl. : MEDIOTRUSION

MOUVEMENT DE PROCLUSION

(n.f.) Etymol. : du latin movere = mouvoir, et claudere = fermer.
Mouvement mandibulaire à direction sagittale postéro-antérieure, avec contacts dento-dentaires.
N.B. : L'inverse est le mouvement de rétroclusion.

Angl. : PROTRUSION



MOUVEMENT DE PROPULSION

(n.f.) Etymol.: du latin movere = mouvoir et prospellere = pousser devant soi, action de pousser en avant.
Mouvement mandibulaire à direction sagittale postéro-antérieure, à partir de l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.), avec ou sans contacts dento-dentaires.
N.B. : Anglicisme : Protrusion. Le mouvement inverse est le mouvement de rétropulsion.

Angl. : PROTRUSION



MOUVEMENT DE PROTRACTION

(n.f.) Etymol. : du latin movere = mouvoir, pro = en avant et tractus, de trahere = tirer.
Mouvement postéro-antérieur de la mandibule de l'Occlusion en Relation Centrée (O.R.C.) vers l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.).
N.B. : Le mouvement inverse est le mouvement de rétrotraction.

Angl. : SLIDE IN CENTRIC



MOUVEMENT DE RÉTROCLUSION

(n.f.) Etymol.: du latin movere = mouvoir, occlusus, de claudere = fermer et retro = en arrière.
Mouvement mandibulaire à direction sagittale antéro-postérieure avec contacts dento-dentaires.
N.B. : Le mouvement inverse est le mouvement de proclusion.

Angl. : RETRUSION



MOUVEMENT DE RÉTROPULSION

(n.f.) Etymol. : du latin movere = mouvoir, retro = en arrière et pulsion, de pellere = pousser.
Mouvement mandibulaire à direction sagittale antéro-postérieure, vers !'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.) avec ou sans contacts dento-dentaires.
N.B. : Le mouvement inverse est le mouvement de propulsion.



MOUVEMENT DE RÉTROTRACTION

(loc.) Etymol.: du latin movere = mouvoir,retro = en arrière et tractus, de tranere = tirer.
Mouvement mandibulaire à direction sagittale antéro-postérieure, de !'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.) vers !'Occlusion en Relation Centrée (O.R.C.), et décrit par Ferrein en 1744.

Angl. : RETRUSION



MOUVEMENT MANDIBULAIRE

(!oc.).
Déplacement de la mandibule dans les trois directions de l'espace, sous l'effet des muscles manducateurs.

Angl. : MANDIBULAR MOVEMENT

MOUVEMENT TRANSVERSAL

(loc.) Etymol. : du latin movere = mouvoir et transversus = tourné en travers.
Composante transversale du déplacement condylien lors de la diduction.
N.B. : Pour le condyle pivotant il est appelé mouvement de Bennett et, pour le condyle orbitant, il est qualifié d'immédiat puis de progressif.

Angl. : SIDE SHIFT

MOUVEMENT TRANSVERSAL IMMÉDIAT

(!oc.).
Mouvement initial du condyle orbitant à composante principalement transversale lors d'une diduction.

Angl. : IMMEDIATE SIDE SHIFT



MOUVEMENT TRANSVERSAL PROGRESSIF

(loc.)
Mouvement qui suit le déplacement immédiat du condyle orbitant lors d'une diduction.
N.B. : Par rapport au mouvement transversal immédiat, il se caractérise par une composante antérieure dominante.

Angl. : PROGRESSIVE SIDE SHIFT



MOUVEMENT TRAVAILLANT

Voir « Latéralisation »

Angl. : WORKING MOVEMENT

MOUVEMENTS LIMITES

(loc.) Etymol.: du latin movere = mouvoir et limes, limitis = séparation.
Mouvements mandibulaires se produisant aux limites autorisées par les structures dento-musculo-articulaires dans les trois plans de l'espace.

Angl. : BORDER MOVEMENT

OUVERTURE BUCCALE (mouvement d')

Voir « Mouvement d'abaissement mandibulaire »

Angl. : MOUTH OPENING

PROCLUSION (mouvement de)

Voir « Mouvement de proclusion »

PROPULSION (mouvement de)

Voir « Mouvement de propulsion »

PROTECTION CANINE

(loc.) Etymol. : du latin protegere = couvrir par devant, protéger: et du latin caninus, de canis = chien.
Concept introduit par l'école gnathologique faisant appel à une fonction canine thérapeutique.

Angl. : CANINE PROTECTED OCCLUSION

RÉTROCLUSION (mouvement de)

Voir « Mouvement de rétroclusion »

RÉTROPULSION (mouvement de)

Voir « Mouvement de rétropulsion »

RÉTROTRACTION (mouvement de)

Voir « Mouvement de rétrotraction »

TRAJECTOIRE CONDYLIENNE

(loc.) Etymol. : du latin trajectus = traversée ; du grec kondulos = articulation.
Déplacement réel suivi par un condyle lorsqu'il effectue un mouvement de translation.

Angl. : CONDYLIAR PATH

TRAJECTOIRE INCISIVE
(loc.) Etymol.: du latin trajectus = traversée et incisus, de incidere = couper, entailler.
Déplacement suivi par l'incision lorsque les incisives mandibulaires glissent contre les faces linguales des incisives maxillaires de la position d'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.) au bout à bout incisif et inversement.
Angl. : INCISAL PATH

TRAJET CONDYLIEN
Voir « Trajectoire condylienne »
Angl. : CONDYLAR PATH

TRAJET INCISIF
Voir « Trajectoire incisive »
Angl. : INCISAL PATH

TERMINOLOGIE ANATOMIQUE

APPAREIL (def. 2026)
etymol : du latin apparatus
Ensemble d'organes et de tissus dissemblables mais interdépendants qui concourent à des fonctions communes.

Remarques : l'appareil manducateur emprunte des structures appartenant aux systèmes nerveux, circulatoire, musculaire, glandulaire (salivaire), squelettique et dentaire.
Il sera donc préférable d'utiliser les termes « d'appareil manducateur » plutôt que « système stomatognathique » ou « système masticateur ».

Terme en relation : Système
Angl. : APPARATUS

APPAREIL MANDUCATEUR
(loc.) Etymol : du latin apparatus = dispositif et manducare = action de manger.
Ensemble dento-musculo-squelettique permettant la réalisation des fonctions orales, dont la manducation. Il est constitué
- du système dentaire.
- du système neuro-musculaire.
- du squelette crânio-facial.

Angl. . MANDUCATORY APPARATUS

ARTICULATION TEMPORO MANDIBULAIRE
(!oc.)
Diarthrose bicondylienne à disque interposé (entre le processus condylien et le tubercule articulaire). Elle est paire, et a pour originalité de permettre des mouvements mandibulaires dans toutes les directions de l'espace (par rotation et translation). La liaison des articulations (droite et gauche) par la mandibule conditionne l'interdépendance fonctionnelle de celles-ci.
Angl. : TEMPOROMANDIBULAR JOINT

CENTRIFUGE
Voir « mouvement deLatéralisation »
Anql : CENTRIFUGAL

CENTRIPÈTE
Voir « Mouvement de Médialisation »
Anql : CENTRIPETAL

CLASSES D'ANGLE (def. 2026)
Etymol : du latin classificare, de classis = classe et ficare: faire
Classification des malocclusions, en denture permanente, basée sur les rapports de la première molaire mandibulaire par rapport à la première molaire maxillaire dans le sens sagittal (la première molaire maxillaire étant considérée comme fixe). Actuellement et par extension, elle s'applique aux premières molaires et aux canines.

Les Classes : les relations sont observées en OIM
- ***Classe I*** : la première molaire mandibulaire est en position mésiale d'une demi cuspide par rapport à la première molaire maxillaire
- ***Classe II*** : distoclusion de la première molaire mandibulaire d'au-moins une demi cuspide
- ***Classe III*** : mésioclusion de la première molaire mandibulaire d'au-moins une demi cuspide

Remarque : pour Angle, la Classe I est une malocclusion. Le terme Classe I est parfois utilisé incorrectement comme synonyme d'occlusion normale alors qu'en réalité il ne s'applique qu'à une relation normale des premières molaires maxillaire et mandibulaire dans le plan sagittal.



Les divisions : n'intéressent que la Classe II
- ***la Classe II division 1*** se caractérise par la vestibulo-version de l'ensemble du bloc incisivo canin maxillaire,
- ***la Classe II division 2*** par la linguo-version des incisives centrales maxillaires.

Les subdivisions s'appliquent aux Classes II et aux Classes III et indiquent que le côté non signalé est en Classe I.
- ***Classe II et Classe III partielle*** : lorsque les molaires présentent un décalage d'une demi-cuspide en Classe II ou en Classe III (relations cuspide-cuspide), on parle de Classe II ou Classe III partielle (anomalie de calage-instabilité).



- ***Classe II et Classe III totale*** : Lorsque le décalage est d'une cuspide (relation cuspide-fosse), on parle de Classe II ou Classe III totale (pas d'anomalie de calage-stabilité).



Terme en relation : Angle EH

CLASSIFICATION DE BALLARD
(loc.)
Classification des rapports squelettiques maxillo-mandibulaires : Classe I. II. III.
Angl. : BALLARD'S CLASSIFICATION

CONDYLE MANDIBULAIRE
(loc.) Etymol. : du grec kondulos = articulation ; du bas latin mandibula = mâchoire.
Extrémité articulaire du processus condylien de forme ovoïde à grand axe oblique en arrière et en dedans. Une crête mousse divise sa face supérieure en deux versants :
- un antérieur, articulaire,
- un postérieur, no
- n articulaire.

La surface articulaire est limitée :
- à l'extérieur par le pôle latéral,
- à l'intérieur par le pôle médial.

Angl. : MANDIBULAR CONDYLE

CONTRO-LATÉRAL
(adj.) Etymol. : du latin contra = en sens contraire et latus, lateralis = du côté.
Qui est situé du côté opposé par rapport au plan sagittal médian.
Angl. : CONTRALATERAL

DISQUE ARTICULAIRE
(loc.)
Élément lenticulaire, avasculaire, composé de tissu fibreux. Il assure la congruence des surfaces articulaires. Il s'interpose entre le processus condylien et le tubercule temporal délimitant ainsi deux espaces : condylo-discal et discotemporal.
Angl. : JOINT DISC OR DISK, INTERARTiCULAR DISC

FACE
(loc.) Etymol. : du latin facies = face.
Partie antérieure de la tête située entre la tangente supérieure aux sourcils (ligne bi-ophryaque) et le Gnathion. Elle se compose de deux étages délimités par le point sous-nasal.
Angl. : FACE

HOMOLATÉRAL
(adj.) Etymol.: du grec homos = pareil ; du latin lateralis = du côté.
Qui est situé du même côté par rapport au plan sagittal médian.
Angl. : HOMOLATERAL

INFRA-ORBITAIRE {point)
(loc.) Etymol.: du latin infra= en dessous et punctum = point ; du latin orbis= cercle.
Point le plus déclive du rebord antéro inférieur de la cavité orbitaire.
Angl. : ORBITAL

INTERLIGNE ARTICULAIRE
(!oc.)
Image radiologique, radio claire, correspondant à la projection de la zone limitée par les structures osseuses de l'ATM.
Angl. : DISC SPACE

LATÉRAL
(adj.) Elymol. : du latin lateralis = qui tient au côté
Caractérise une face ou un mouvement, qui regarde ou qui s'éloigne du plan sagittal médian

MÉDIAL
(adj.)
Caractérise une face ou un mouvement dirigé(e) vers le plan sagittal médian.
N.B. : Par opposition à « Latéral ».
Angl. : MEDIAL

MUSCLES MANDUCATEURS
(loc.)
Muscles concourant à la fonction manducatrice. Ce terme inclut les muscles masticateurs et les muscles concourant à la mobilisation de la langue, des lèvres et des joues.

MUSCLES MASTICATEURS
(loc.).
Muscles concourant aux mouvements de la mandibule en particulier à la fonction masticatrice. Ce terme inclut les muscles élévateurs et les muscles abaisseurs de la mandibule.
Angl. : MASTICATORY MUSCLES

PORION
(n. m.) Etymol.: du grec poros = tout lieu de passage d'un espace à un autre.
Bord supérieur des méats acoustiques.
Angl. : PORION

PROCESSUS CONDYLAIRE
(loc.) Etymol.: du latin procedere = avancer ; du grec kondulos = articulation.
Prolongement osseux postéro-supérieur du ramus composé du col condylaire surmonté du condyle mandibulaire.
Angl. : CONDYLE, MANDIBULAR CONDYLE



PROCESSUS CORONOÏDE
(loc.) Etymol : du latin procedere = avancer et corona = couronne.
Prolongement osseux antéro-supérieur du ramus.
Angl. : CORONOID PROCESS



PROSTHION
(n.m.) Etymol.: du grec prosthios = placé devant, placé en avant
Point osseux le plus antérieur et le plus déclive du rebord alvéolaire maxillaire.

SOUS-ORBITAIRE (point)
Voir « Infra-orbitaire »
Angl. : ORBITAL

SQUELETTE CRANIO-FACIAL
(loc.) Etymol. : du grec skeletos = desséché et kranion = crâne ; du latin facies = face.
Ensemble des éléments osseux ou non (massif facial supérieur et mandibule) dont la structure rigide participe entre autres à la fonction manducatrice.
Angl. : FACIAL SKULL SKELETON

SYSTEME (def. 2026)
etymol : du grec sustêma « réunion en corps de plusieurs objet »
Ensemble des organes ou tissus ayant une structure analogue ou semblable

Remarque : les termes « système stomatognathique » ou « système masticateur » sont à remplacer par « appareil manducateur ».

Terme en relation : Appareil

Angl. : SYSTEM

SYSTÈME ARTICULAIRE
(lac.) Etymol.: du grec sustêma = ensemble ; du latin articularis = de l'articulation.
Ensemble des éléments articulaires qui participent au guidage des mouvements mandibulaires :
- condyle mandibulaire,
- fosse mandibulaire,
- tubercule articulaire,
- disque articulaire,
- capsule articulaire,
- ligaments et attaches.

Angl. : JOINT SYSTEM

SYSTÈME DENTAIRE
(loc.) Etymol. : du grec sustêma = ensemble ; du latin dens, dentis = dent.
Ensemble des organes dentaires (dents et parodonte) organisé en arcades maxillaire et mandibulaire.

Angl. : DENTAL SYSTEM

SYSTÈME NEURO-MUSCULAIRE (crâniofacial)
(loc.) Etymol. : du grec sustêma = ensemble et neuron = nerf; du latin musculus = petit rat.
Ensemble des éléments neuro-musculaires de l'appareil manducateur :
- muscles manducateurs augmentés des muscles peauciers de la face et des muscles de la langue,
- nerf trijumeau (V).
- nerf facial (VII) et glosso-pharyngien (IX).

qui contribuent à l'accomplissement des fonctions orales de l'appareil manducateur.

Angl. : NEUROMUSCULAR SYSTEM

TRAGION
(n.m.) Etymol.: du grec tragos = bouc. cavité de l'oreille garnie de poils (comme le bouc)
Point le plus élevé du rebord supérieur du tragus.

Angl. : TRAGION

TRAGUS
(n.m.) Etymol.: du grec tragos = bouc.
Saillie du pavillon de l'oreille située à l'avant du conduit auditif externe, sous la racine de l'hélix.

Angl. : TRAGUS

TUBERCULE ARTICULAIRE (du temporal)
(!oc.) Etymol.: du latin tuberculurn, diminutif de tuber = tumeur et articularis = de l'articulation.
Racine transverse du processus zygomatique du temporal.
N.B. Rappels :
- éminence = élévation ou protubérance sur une surface,
- tubercule = petite éminence arrondie.
- procès = prolongement d'un organe ou d'une structure.

Angl. : TEMPORAL CONDYLE

FONCTIONS

CIRCUMDUCTION
(n.f.) Etymol. : du latin circum = autour et ducere = conduire.
Ensemble de mouvements complexes de la mandibule participant aux fonctions orales.

Angl. : CIRCUMDUCTION

CYCLE DE MASTICATION
(loc.) Etymol. : du grec kuklos = cercle : du latin masticare = mâcher.
Succession de mouvements physiologiques mandibulaires au cours de la mastication.

Angl. : MASTICATION CYCLE



DIAGRAMME DE POSSELT
(loc.) Etymol. : du grec diagramma = dessin.
Représentation graphique de l'enveloppe des mouvements mandibulaires limites (figurés au niveau de l'incision) dans les trois plans de l'espace.

Angl. : POSSELT'S DIAGRAM

DIMENSION VERTICALE D'OCCLUSION (D.V.O.)
(loc.)
Hauteur de l'étage inférieur de la face mesurée entre deux repères (par exemple : points Sous-Nasal et Gnathion), lorsque les arcades sont en Occlusion d'Intercuspidie Maximum (O.I.M.).

Angl. : VERTICAL DIMENSION OF OCCLUSION

DIMENSION VERTICALE DE REPOS (D.V.R.)
(loc.) .
Hauteur de l'étage inférieur de la face, mesurée entre deux repères, lorsque la mandibule est en posture de repos ou posture d'inocclusion physiologique.

Angl. : REST VERTICAL DIMENSION

ENTRÉE DE CYCLE DE MASTICATION
(loc.) Etymol. : du latin intrare = entrer, masticare = mâcher ; du grec kuklos = cercle.
Phase dento-dentaire initiale du cycle de mastication concourant à la préhension et au cisaillement des aliments par les dents cuspidées.

Angl.: INCURSIVE MASTICATORY STROKE



FONCTION (def. 2026)
Du latin functio = accomplissement
Ensemble des activités potentielles, coordonnées et physiologiques d'un organe, un système ou un appareil concourant à une finalité précise.

Termes en relation : eufonction, orthofonction, dysfonction, pathofonction

Angl : FUNCTION

FONCTIONNEMENT
(n.m.) Etymol.: du latin functio = accomplissement.
Mode d'expression de la fonction.

Angl. : FUNCTIONING

FONCTION ORALE
(loc.) Etymol.: du latin functio = accomplissement et os, oris = bouche.
Ensemble des fonctions dans lesquelles l'appareil manducateur est impliqué : préhension, manducation, ventilation, fonctions de relation (phonation, mimique…) et expression des émotions.

Angl. : ORAL FUNCTION

MANDUCATION
(n.f.) Etymol. : du latin manducare = manger.
Fonctions orales de nutrition précédant la digestion : préhension, insalivation, gustation, mastication, déglutition.

Angl. : MANDUCATION

MASTICATION
(n.f.) Etymol.: du latin masticatio, de masticare = mâcher.
Fonction manducatrice dans laquelle la consistance des substances alimentaires placées en bouche est mécaniquement modifiée afin de les rendre aptes à être dégluties.

Angl. : MASTICATION

MASTIQUANT (côté)
Voir « Côté mastiquant »

Angl. : WORKING SIDE

OCCLUSION CENTRÉE
Voir « Occlusion d'Intercuspidie Maximale>>

Angl. : CENTRIC OCCLUSION

OCCLUSION D'INTERCUSPIDATION MAXIMALE
Voir « Occlusion d'Intercuspidie Maximale »

Angl. : MAXIMUM NTERCUSPATION

OCCLUSION D'INTERCUSPIDIE MAXIMALE (O.I.M.)
(!oc.) Etymol. : du latin occlusus, de claudere = fermer, inler = entre, cuspis, cuspidis = pointe, et maximum = le plus grand.
Position d'occlusion où le rapport d'engrènement dentaire se caractérise par le maximum de contacts interarcades. Ce rapport est indépendant de la situation des condyles dans les fosses mandibulaires.

Angl. : MAXIMUM IN ERCUSPATION

OCCLUSION DE CONVENANCE
Voir « Occlusion fonctionnelle »

OCCLUSION DENTAIRE
(!oc.)
État, à un instant donné, d'un rapport inter-arcades défini par au moins un point de contact. Par extension, toute situation de contact inter-arcades.

Angl. : DENTAL OCCLUSION, BITE

OCCLUSION EN RELATION CENTRÉE (O.R.C)
(loc.)
Position d'occlusion, la mandibule étant en relation centrée.

Angl. : RETRUDED CONTACT POSITION

OCCLUSION HABITUELLE
Voir « Occlusion fonctionnelle »

Angl. : HABITUAL OCCLUSION

OCCLUSION FONCTIONNELLE
(loc.) Etymol. : du latin occlusus.de claudere = fermer et functio = accomplissement.
Relation occlusale adaptative, différente de la normocclusion, permettant les fonctions orales sans générer d'atteinte structurelle.

Angl. : FUNCTIONAL OCCLUSION

POSITION D'INOCCLUSION PHYSIOLOGIQUE
Voir « Posture de repos »

Angl : PHYSIOLOGICAL REST POSITION

POSITION D'INTERCUSPIDATION MAXIMALE
Voir « Occlusion d'Inlercuspidie Maximale »
(O.I.M.)

Angl. : MAXIMUM INTERCUSPATION POSITION

POSITION D'INTERCUSPIDIE MAXIMALE
Voir « Occlusion d'Intercuspidie Maximale »
(O.I.M.)

Angl. : MAXIMUM INTERCUSPATION POSITION

POSITION DE REPOS
Voir « Posture de repos »

Angl. : REST POSITION

POSITION LIMITE
(loc.)
Position périphérique extrême, le plus souvent reproductible, lors des mouvements mandibulaires (propulsion, rétropulsion, abaissement et diductions).
N.B. : Les différentes positions limites bornent l'enveloppe des mouvements.

Angl. : BORDER POSITION

POSTURE DE REPOS
(loc.) Etymol. : du latin postura = posture.
Situation de la mandibule en inocclu sion physiologique (dite de repos) alors que l'activité minimale des muscles mas ticateurs est en équilibre tonique

Angl. : REST POSTION

PRAXIE (def. 2026)
Etymol : du grec prassein, « aller jusqu'au bout », puis « exécuter, agir, travailler »...
Capacité à planifier, organiser et exécuter ou automatiser des gestes et des mouvements déterminés pour réaliser une action finalisée. Elle est acquise, peut être isolée au sein d'une fonction et ainsi être rééduquée.

Exemples : siffler, claquer la langue, embrasser, souffler les bougies, faire des bulles, serrer les dents mais aussi déglutir, mastiquer, ventiler…

Termes en relation : dyspraxie, apraxie, fonction, dysfonction

Angl : PRAXIS

SORTIE DE CYCLE DE MASTICATION
(loc.) Etymol. : du latin pop. surctus, de surgere = jaillir; du grec kuklos = cercle; du latin masticatio, de masticare = mâcher.
Phase dento-dentaire terminale du cycle de mastication concourant à l'écrasement des aliments par les dents cuspidées.

Angl. : EXCURSIVE MASTICATORY STROKE



DYSFONCTIONS (APPAREIL MANDUCATEUR)

CLAQUEMENT ARTICULAIRE
(loc.)
Gnathosonie distincte émise lors de certains mouvements mandibulaires.
Angl.. : JOIN CLICKING

CRÉPITATION ARTICULAIRE
(loc.) Etymol. : du bas latin crepitatio, de crepitare = pétiller, craquer et du latin articularis = de l'articulation.
Succession de gnathosonies émises lors des mouvements mandibulaires.
N.B Ces crépitations sont le plus souvent constatées dans les situations arthrosiques.
Angl. : JOiNT CREPITUS

DÉRANGEMENT INTERNE
(loc.)
Ensemble de situations intra-capsulaires de l'Articulation Temporo-Mandibulaire qui résultent d'un changement des relations fonctionnelles condylo-discales.
Angl. : INTERNA.LDERANGEMENT

DÉSORDRES CRANIO-MANDIBULAIRES (D.C.M.)
Voir « Dysfonctionnement de /'appareil manducateur » (D.A.M.)
Anglicisme.
Angl. : CRANIOMANDIBULAR DISORDERS (CMD)

DÉSORDRES TEMPORO MANDIBULAIRES (D.T.M)
Voir « Dysfonctionnement de /'appareil manducateur » (DAM.)
Anglicisme.
Angl. : TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

DYSFONCTION
(n.r.) Etymol. : préfixe grec dis=de façon défectueuse + latin functio= accomplissement
Potentialité de perturbations des activités fonctionnelles pouvant conduire à des comportements adaptatifs.
N.B. Parfois utilisé abusivement pour « Dysfonctionnement ».
Angl. : DYSFUNCTION

DYSFONCTIONNEMENT (def.2026)
Etymol : du grec dys= déformation; du latin functio=accomplissement
Le dysfonctionnement réside dans des comportements adaptatifs inexistants ou ne permettant pas d'assurer simultanément la réalisation des activités fonctionnelles et la protection des organes.

Remarque : il existe trois degrés de dysfonctionnement :
- léger : altération fonctionnelle,
- modéré : réduction fonctionnelle,
- sévère : impotence fonctionnelle.

Termes en relation : dysfonctionnements de l'Appareil Manducateur
Angl : DYSFUNCTION

DYSFONCTIONNEMENTS TEMPOROMANDIBULAIRES (DTM) (def.2025)
(loc.) Etymol.: préfixe grec dis=de façon défectueuse + latin functio= accomplissement.
Expression symptomatique d'une myoarthropathie de l'appareil manducateur.

Remarque : dans le but d'une harmonisation internationale, ce terme sera préféré au terme de Dysfonctionnement de l'Appareil Manducateur (DAM).

Termes en relation : Appareil manducateur, Dysfonctionnement, Myoarthropathie
Termes obsolètes *: Syndrome de Costen, Syndrome Algo-dysfonctionnel de l'Appareil Manducateur (*SADAM), *Algie et Dysfonctionnement de l'Appareil Manducateur (*ADAM), *Dysfonctionnement de l'Appareil Manducateur (*DAM), *Dysfonctionnement cranio-mandibulaire DCM), Troubles temporo mandibulaires, Désordres temporo-mandibulaires. (par ancienneté)*
Angl : TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

DYSPRAXIE (def. 2026)
Etymol. : préfixe grec dis=de façon défectueuse; du grec prassein= « aller jusqu'au bout », puis « exécuter, agir, travailler »...
Trouble caractérisé par une altération de la capacité à planifier, organiser et exécuter ou automatiser des gestes et des mouvements déterminés pour réaliser une action finalisée, en l'absence de paralysie ou de parésie des muscles impliqués dans ces mouvements.

Remarque : ce trouble est lié à des déficits dans l'acquisition ou l'exécution de compétences motrices coordonnées. Les capacités d'apprentissages sont préservées.

Termes en relation : praxie, apraxie, fonction, dysfonction
Terme équivalent : Trouble Développemental de la Coordination (TDC)
Angl: DYSPRAXIA

GNATHOSONIES
(loc.) Etymol.: du grec gnatnos = mâchoire ; du latin sonus = son.
Ensemble de bruits émis par l'articulation temporo-mandibulaire en mouvement
Angl. : JOINT SOUNDS

INCOORDINATION CONDYLO-DISCALE
(loc.) Etymol. : du latin in= privé ; du bas latin coordinatio, de ordinatio = mise en ordre ; du grec kondulos = articulation et diskos = disque.
Défaut de coaptation fonctionnelle entre le disque et le processus condylaire.

LUXATION CONDYLO-TEMPORALE
(loc.) Etymol. : du latin luxare = déboîter, temporalis = de la tempe ; du grec kondulos = articulation.
Déplacement pathologique du processus condylaire ou du complexe condylodiscal au-delà du tubercule temporal.
Angl. : CONDYLAR DISLOCATION

PATHOFONCTION (def. 2026)
Etymol … patho: et du latin functio=accomplissement.
Dysfonction dépassant les capacités d'adaptation des structures.

Termes en relation : Dysfonction, dysfonctionnement
Angl : PATHOFUNCTION

TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION (TDC) (def.2026)
Voir : Dyspraxie
Angl : DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER (DCD)

PARAFONCTION

BRUXISME
(n.m.) Etymol. : du grec brukein = grincer des dents.
Comportement qui se caractérise par une activité motrice involontaire des muscles manducateurs continue (serrement) ou rythmique (grincement), avec contacts occlusaux.
Angl. : BRUXISM

PARAFONCTION
(n.f.) Etymol.: du grec para = à côté ; du latin funclio = accomplissement.
Ensemble d'activités coordonnées ne concourant pas à une finalité fonctionnelle.
Angl. : PARAFUNCTION

PARAFONCTION ORALE (def. 2026)
Etymol : du grec para=à coté; du latin functio=accomplissement
Ensemble d'activités orales coordonnées ne concourant pas à une activité fonctionnelle

Termes en relation : Dysfonction
Angl : Parafunction

MÉCANIQUE - CONCEPTS

CINÉMATIQUE (def.2025)

Etymol. : du grec kínēma = mouvement et -ikpos = relatif à

Partie de la mécanique qui étudie le mouvement en fonction du temps sans considérer les forces qui le génèrent et le modifient.

Termes en relation : statique, dynamique (cf schéma), mécanique

Angl. : KINEMATICS



CINÉMATIQUE CONDYLIENNE

(loc.l Etymol. : du grec kinêma= mouvement + suffixe -ikos =relatif à, et kondulos = articulation.

Cinématique des condyles au cours des mouvements mandibulaires.

Angl. : CONDYLAR KINEMATICS

CINÉMATIQUE MANDIBULAIRE

(loc.) Etymol. : du grec kinêma= mouvement + suffixe -ikos =relatif à, et du bas latin mandibula= mâchoire.

Cinématique de la mandibule au cours de ses mouvements.

Angl. : MANDIBULAR KINEMATICS

DYNAMIQUE (def.2025)

Etymol. : du grec dunamis= puissance + suffixe -ikos= relatif à.

Partie de la mécanique qui étudie le mouvement dans ses rapports avec les forces qui le génèrent et le modifient.

Termes en relation : statique, cinématique (cf schéma), mécanique

Angl. : DYNAMICS



CÔTÉ ÉQUILIBRANT

Voir « Côté non mastiquant »

N.B. Terme utilisé surtout en prothèse adjointe totale.

.

MÉDIALISATION (mouvement de)

Voir « Mouvement de médiatisation »



MÉDIOCLUSION {mouvement de)

Voir « Mouvement de médioclusion »



MOUVEMENT ÉQUILIBRANT

Voir « Médialisation »

N.B. : Terme utilisé en prothèse totale.

NON MASTIQUANT (côté)

Voir « Côté non mastiquant »

MOUVEMENT NON TRAVAILLANT

Voir « Médialisation »

Angl. : NONWORKING MOVEMENT

NORMOCCLUSION

(n.f.) Etymol. : du latin norma = règle et occlusus, de claudere = fermer.

Modèle idéal des relations occlusales.

Angl. : NORMOCLUSION

OCCLUSION MUTUELLEMENT PROTÉGÉE

(ioc.) Etymol. : du latin occlusus, de c/audere = fermer, rnutus = réciproque et protegere = couvrir par devant

Concept introduit par l'école gnathologique définissant le rôle complémentaire des dents cuspidées et des dents antérieures. Dans ce concept, les dents cuspidées assurent la stabilité de l'occlusion statique en Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.) et les dents antérieures prennent en charge les seuls contacts dento dentaires de guidage au cours de la cinématique mandibulaire.

Angl. : MUTUALLY PROTECTED OCCLUSION

STATIQUE (def.2025)

Etymol. : du latin stare=se tenir debout, se tenir immobile.

La statique étudie les corps au repos ou en équilibre sous l'action de forces.

Remarque : La statique est un cas particulier de la dynamique pour lequel la somme des forces et des moments appliqués sur l'objet est nulle.

Termes en relation : cinématique, dynamique (cf schéma), mécanique.

Angl. : STATICS



DIAGNOSTIC-TRAITEMENT

ANALYSE OCCLUSALE
(loc.) Etymol. : du grec analysis = action de décomposer + latin occlusus, de claudere = fermer.
Étude méthodique à l'aide de moulages :
- des rapport intra-arcades,
- des rapports inter-arcades, dans les différentes positions mandibulaires,
- des positions condyliennes induites par ces rapports.

Elle précise les hypothèses diagnostiques issues de l'examen occlusal clinique et permet des simulations thérapeutiques sur articulateur.
Angl. : OCCLUSAL ANALYSIS

AXIOGRAPHIE
(n.f.)
Condylographie particulière dont le point observé se trouve sur l'axe bi-condylien.
Voir « Condylographie »
Angl. : AXIOGRAPHY

BUTÉE ANTÉRIEURE
(loc.)
Dispositif, le plus souvent en résine, placé au niveau antérieur et permettant de faciliter l'enregistrement de la Relation Centrée.
Angl. : JIG

CIRE AJOUTÉE (technique de la)
(loc.)
Démarche codifiée de reconstruction coronaire en cire, par ajouts successifs.
Angl. : WAX-UP (technique)

EXAMEN OCCLUSAL
(loc.)
Évaluation clinique des rapports dentodentaires statiques et cinématiques.
Angl. : OCCLUSAL EXAMINATION

GOUTTIÈRE OCCLUSALE
Voir « Orthèse inter-occlusale »
Angl. : OCCLUSAL SPLINT



INDENTATION
(n.f.) Etymol.: du latin dens, dentis = dent et in = dans.
Traces laissées sur un matériau par les dents lors d'une élévation mandibulaire.
Angl. : OCCLUSAL INDENTATION

INDICATEUR DE POSITION MANDIBULAIRE
(loc.)
Dispositif mécanique permettant une comparaison tridimensionnelle des différentes positions mandibulaires.
N.B. : Les positions les plus souvent comparées sont !'Occlusion en Relation Centrée (O.R.C.) et l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M).
Angl. : MANDIBULAR POSITIONING INDICATOR

JIG DE LUCIA
(loc.) Terme anglo-saxon signifiant «guide».
Voir « Butée antérieure »
Angl. : JIG

MARQUEUR D'OCCLUSION
(loc.)
Colorant présenté sous différentes formes de support (papier, film…) permettant de matérialiser les contacts occlusaux.
Angl. : OCCLUSAL MARKER

MODÈLE
Voir « Moulage »
Angl.: MODEL

MONTAGE DIRECTEUR
(loc.)
Construction finalisée obtenue par l'élaboration, généralement en cire, d'un projet thérapeutique.
Angl. : DIAGNOSTIC SET UP

MOULAGE
(n.m.)
Reproduction d'un élément, obtenue à l'aide d'une empreinte, et réalisée le plus souvent en plâtre.
Angl.: CAST

MOUVEMENT AXIAL TERMINAL
(loc.)
Rotation de la mandibule autour de l'axe charnière.
Angl. : TERMINAL HINGE AXIS MOVEMENT

OCCLUSOGRAMME
(n.m.) Etymol. : du latin occlusus, de claudere = fermer ; du grec gramma = lettre, inscription, dessin, tracé
Enregistrement des contacts occlusaux dans une relation inter-arcades donnée.
Angl. : OCCLUSAL RECORD

ORTHÈSE INTEROCCLUSALE
(loc.) Etymol.: du latin inter = entre, occlusus, de claudere = fermer ; du grec orthos = droit, normal, correct.
Dispositif, généralement réalisé en résine, fixé à titre temporaire sur l'arcade maxillaire ou sur l'arcade mandibulaire et ayant pour but de modifier les rapports intermaxillaires de façon réversible.
Angl. : ORTHOTIC APPLIANCE

RELATION CENTREE (def.2025)
(loc.) Etymol.: du latin relatio = action de rapporter à, de mettre en relation avec, + centrum = centre.
Position articulaire de référence, bicondylienne reproductible, indépendante de l'occlusion et de la position du disque articulaire. Elle est obtenue par un Mouvement Axial Terminal (MAT) sans à-coups, réalisé par le patient, induit et stabilisé par le praticien.
Remarque : elle est cliniquement utile ; elle est réitérative dans un temps donné et pour une posture corporelle donnée.
Angl. : CENTRIC RELATION

PATHOLOGIE

HYPERCONDYLIE
(n.f.) Etymol. : du grec huper = au-delà et kondulos = articulation.
Affection se caractérisant par l'hypertrophie du processus condylien.

HYPOCONDYLIE
(n.f.) Etymol. : du grec hupo = dessous et kondulos = articulation.
Affection se caractérisant par une insuffisance de développement du processus condylien.

INFRAGNATHIE
(n.f.)Etymol. : du latin infra= au-dessous ; du grec gnathos = mâchoire.
Malformation verticale engendrée par un hypo-développement maxillaire ou mandibulaire.
Angl. : INFRAGNATHIA

MACROCONDYLIE
(n.f.) Etymol.: du grec makros = long et kondulos = articulation.
Excès de volume du condyle mandibulaire.

MICROCONDYLIE
(adj.) Etymol.: du grec mikros = petit et kondulos = articulation.
Défaut de volume du condyle mandibulaire.

SYNDROME
(n.m.) Etymol.: du grec sundromê = réunion.
Association de plusieurs symptômes, signes ou anomalies constituant une entité clinique reconnaissable pour l'énoncé d'un diagnostic. Contrairement à une maladie, l'étiopathogénie n'est pas précisément établie.
Angl. : SYNDROME

FONCTION-DYSFONCTION (OCCLUSALES)

INTERFÉRENCE OCCLUSALE
(loc.)
Contact occlusal qui limite ou dévie un mouvement mandibulaire harmonieux.
N.B. : L'expression « Interférences occlusales » implique que l'occlusion est gênée par quelque chose, ou que quelque chose interfère avec l'occlusion (W. Mc Horris)
Angl. : OCCLUSAL INTERFERENCE

MALOCCLUSION
(n.f.) Etymol.: du latin malus= mauvais et occlusus, de claudere = fermer.
Relation occlusale différente de la normocclusion. On distingue les malocclusions fonctionnelles et les malocclusions dysfonctionnelles.
Angl. : MALOCCLUSION

OCCLUSION DYSFONCTIONNELLE
(loc.)
Relation occlusale, différente de la normocclusion, pouvant perturber le fonctionnement de !'Appareil Manducateur.
Angl. : DYSFUNCTIONAL OCCLUSION

OCCLUSION PATHOGÈNE
Voir « Occlusion dysfonctionnel/e »
Angl. : PATH OGENIC OCCLUSION

PRÉMATURITÉ OCCLUSALE
(loc.) Etymol.: du latin pre = avant, maturus = arrivé à son terme et occlusus, de claudere = fermer.
Contact occlusal en Occlusion en Relation Centrée (O.R.C.) susceptible de dévier l'élévation mandibulaire.
Angl. : PREMATURE CONTACT, CENTRIC INTERFERENCE

SOUS-OCCLUSION
(nf.l Etymol: du latin subtus = en bas etocclusio. de claudere = fermer.
Caractérise une dent naturelle ou restaurée qui ne présente pas de contact occlusal en Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.)

SUPRACLUSIE
(n.f.) Etymol. : du latin supra= au-dessus, au-delà et occlusus, de claudere = fermer.
Recouvrement antérieur excessif.
Angl. : VERTICAL OVERBITE, OVERCLOSURE

SUPRACLUSION
Voir « Suprac/usie »

SUROCCLUSION
(n.f.) Etymol.: dérivé du latin super ou supra = au-dessus, au-delà et occlusus, de claudere = fermer.
Caractérise une dent restaurée ou naturelle qui présente un contact s'opposant à l'établissement de l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.).
Angl. : OCCLUSAL OVERLOAD

LÉSIONS NON CARIEUSES

ABRASION DENTAIRE
(loc.) Elymol. : du latin abrasio, de abradere
= ôter en raclant et dens, dentis = dent
Perte de substance de la couronne clinique résultant d'un frottement.
Angl. : TO0TH WEAR, ABRASION

ATTRITION
(n.f.) Etymol.: du latin atterere = user par frottement..
Perte de substance physiologique des dents résultant de la fonction occlusale.
Angl. : TOOTH ATTRITION WEAR

ÉROSION DENTAIRE
(loc.l
Perte de substance dentaire liée à un processus de dégradation chimique.
Angl. : TOOTH EROSION

FACETTE D'USURE
(loc.) Etymol. : diminutif de face, du latin facies , et usus= usage, fait de se servir de.
Surface résu!tant d'un phénomène d'attrition ou d'abrasion.

Angl : WEAR FACET

SIMULATEURS

AILE DE BENNETT

(loc.) Etymol. : du latin ala = aile.
Pièce du boîtier condylien de l'articulateur permettant le réglage de la trajectoire médiale de la sphère condylienne.



Dans le cas des articulateurs semi-adaptable de deuxième génération, cette ailette peut être interchangée avec des ailettes de courbures initiales différentes. Le choix de la courbure permet ainsi de se rapprocher de la valeur du mouvement transversal immédiat enregistré sur le patient

ANGLE DE BENNETT

(loc.)
Projection sur un plan horizontal de l'angle formé par la corde de la trajectoire du condyle orbitant avec un plan sagittal pendant la diduction.
.Angl. BENNETT'S ANGLE



ANGLE DE FISCHER

(loc.)
Projection sur un plan sagittal de l'angle formé par la corde des trajectoires du condyle orbitant avec un plan horizontal pendant la propulsion et la médiopulsion.
Angl. : FISCHER'S ANGLE



ARC (facial) DE LOCALISATION

(!oc.) Etymol. : du latin arcus = arc. machine de jet, facies= face; du bas latin localis. de locus= lieu.
Dispositif permettant de repérer les points cutanés d'émergence de l'axe charnière.
N.B. : Lors de faibles mouvements d'ouverture el de fermeture mandibulaire en relation centrée, par ajustages successifs, on obtient une position fixe de la pointe de l'aiguille condylienne qui se trouve alors sur l'axe charnière.
Angl. : FACE BOW

ARC (facial) DE TRANSFERT

(loc.)
Dispositif destiné à repérer et à transférer la position de l'arcade maxillaire sur l'articulateur par rapport à un plan de référence, le plus souvent le plan axioorbitaire.
Angl. : FACE BOW

ARC GOTHIQUE DE GYSI

(loc.)
Projection d'un point mandibulaire médian sur un plan horizontal lors des trajectoires de diduction sans guidage dentaire.
N.B. Le point de convergence des tracés de diduction correspond à une position de référence proche de la Relation Centrée.
Voir « Gnathogramme de Balkwill »
Angl. : GYSIS GOTHIC ARCH



ARCON

(n.m.) Articulateur dont les sphères condyliennes sont solidaires de la branche inférieure par analogie avec les rapports anatomiques liant la mandibule au crâne.
N.B. Il existe des articulateurs dits anti-arcon : les sphères condyliennes sont solidaires de la branche supérieure.
Angl. : ARCON

ARTICULATEUR

(n.m.)
Dispositif mécanique supportant les moulages maxillaire et mandibulaire et simulant les relations occlusales dans différentes positions mandibulaires.
N.B. Un articulateur présente une branche supérieure et une branche inférieure reliées par un système sphère-boîtier au niveau postérieur et un système tige incisive - table incisive au niveau antérieur.
On distingue des articulateurs non-adaptables, semi-adaptables ou entièrement adaptables en fonction des possibilités techniques de réglage de leurs boîtiers condyliens.
Angl. : ARTICULATOR

ATTELLE DE FIXATION

(loc.)
Dispositif temporaire solidarisant la mandibule à un système d'enregistrement.
N.B. : On distingue les attelles de fixation occlusale (type gouttière) et des attelles de fixation para-occlusales n'interférant pas sur les relations occlusales naturelles du sujet.
Angl. : CLUTCH

AXE BICONDYLIEN
(loc.) Etymol. : du latin axis = essieu, bis = les deux, redoublement ; du grec kondulos = articulation.
Droite virtuelle transversale (passant par les deux condyles mandibulaires) autour de laquelle la mandibule peut effectuer un mouvement d'ouverture-fermeture en rotation.
N.B. Lorsque les condyles sont en relation centrée, cet axe est appelé axe charnière et le mouvement est qualifié de mouvement axial terminal
Angl. : TRANSVERSE HORIZONTAL AXIS



AXE CHARNIÈRE
(loc.)
L'axe bi-condylien est appelé axe charnière lorsque les condyles sont en relation centrée.
N.B.· Le mouvement axial terminal se réalise autour de l'axe charnière.
Voir « Point d'émergence »
Angl. : HINGE AXIS

AXE INSTANTANÉ DE ROTATION
(loc.)
Droite virtuelle autour de laquelle la mandibule effectue une rotation à un instant donné.
N.B. : Le déplacement dans le temps et dans l'espace de cet axe de rotation caractérise le mouvement mandibulaire de roto-translation.
Angl. : INSTANTANEOUS AXIS OF ROTATION

BOITIER CONDYLIEN
(loc.) Etymol. : du latin buxis = buis, objet en bois de buis ; du grec kondulos=proéminence osseuse, articulation.
Dispositif mécanique guidant les déplacements d'une des deux boules condyliennes de l'articulateur.
Angl. : ARTICULAR HOUSING

CALE(ou vis) DE PROPULSION
(loc.)
Dispositif placé sur un articulateur permettant de provoquer l'avancée de la boule condylienne.
Anql. : PROTRUSION PROGRAMMING DEVICE

CALE DE DÉCOMPRESSION
(loc.)
Dispositif placé généralement dans le boîtier condylien d'un articulateur permettant l'abaissement de **la** boule condylienne.

CLUTCH
(n.m.) Terme anglo-saxon.
Anglicisme : voir « Attelle ».

CONDYLIEN (point)
(loc.)
Point cutané ou osseux d'émergence de l'axe charnière.

CONDYLOGRAPHIE
(n.f.) Etymol. : du grec kondulos = arliculation et graphein = écrire, inscrire.
Analyse instrumentale de la cinématique condylienne par l'enregistrement de la projection des déplacements d'un point condylien dans les trois plans de l'espace.
Angl. : CONDYLOGRAPHY

DOUBLE BASE ENGRENÉE
(loc.)
Socle dissociable d'un moulage permettant son repositionnement précis sur l'articulateur et le contrôle de la reproductibilité des enregistrements de la relation centrée.
Angl : SPLIT CAST

DRAPEAU (technique du)
(loc.l.
Technique permettant la détermination d'une courbe de Spee sur l'articulateur.
Angl. : BROADRICKS OCCLUSAL PLANE

LOCALISATEUR D'AXE CHARNIÈRE
Voir « Arc de localisation »

MANDIBULOGRAPHIE
(n.f.) Etymol. • du bas latin mandibula = mâchoire ; du grec graphein = écrire, inscrire, dessiner.
Enregistrement, graphique ou électronique, des mouvements mandibulaires.
N.B. : Exemple d'appareillages permettant une mandibulographie : le Replicator, l'Electrognathographe, le Kinésiographe.

OCCLUSEUR
(n.m.) Etymol.: du latin *occlusus,* de *claudere* = fermer.
Dispositif mécanique permettant l'accès à une position d'occlusion (généralement la position d'Occlusion d'Intercuspidie Maximale) entre deux moulages et n'autorisant aucun mouvement mandibulaire.
N.B. : Il existe des occluseurs avec ou sans calage antérieur.
Angl. : CAST RELATOR

PANTOGRAPHE
(n.m.) Etymol.: du grec pan, pantos = tout et graphein = écrire, inscrire.
Dispositif mécanique ou électronique d'enregistrement graphique de la projection des mouvements mandibulaires.
Angl. : PANTOGRAPH

PANTOGRAPHIE
(n.f.l Etymol.: du grec pan, pantos = tout et graphein = écrire, inscrire.
Analyse instrumentale de la projection de la cinématique mandibulaire dans les trois plans de l'espace.
Voir « Pantographe »
Angl. : PANTOGRAPHY

PENTE CANINE
(loc)



Angle formé par la projection, dans un plan frontal, du trajet du contact canin mandibulaire sur la canine maxillaire par rapport au plan horizontal de référence axio-orbitaire. Ce trajet canin est déterminé entre l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.) et le bout-à-bout canin en diduction dans des conditions d'occlusion fonctionnelle.
Angl. : CANINE GUIDANCE, CUSPID GUIDANCE

PENTE CONDYLIENNE
(loc.)
Angle formé par la projection dans un plan sagittal avec le plan horizontal de référence axio-orbitaire du trajet condylien lors de la propulsion ou de la diduction.
Angl. : CONDYLAR PATH



PENTE CUSPIDIENNE
(loc.)
Angle formé par la tangente à la crête cuspidienne par rapport à un plan de référence.
Angl. : CUSP ANGLE

PENTE CUSPIDIENNE ABSOLUE
(loc.)
Angle formé par la tangente à la crête cuspidienne par rapport au plan occluso-dentaire perpendiculaire au grand axe de la dent.
Angl. : EFFECTIVE CUSPANGLE

PENTE CUSPIDIENNE RELATIVE
(loc.)
Angle formé par la tangente à la crête cuspidienne avec un plan de référence horizontal extrinsèque (plan d'occlusion, plan axio-orbitaire, etc.).
Angl. : SAGITTAL CUSP ANGLE

PENTE INCISIVE
(loc.)r.
Angle formé par la projection, dans un plan sagittal avec le plan horizontal de référence axio-orbitaire, du trajet incisif en propulsion entre l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M) et le bout à bout incisif.



PLAN AXIO-ORBITAIRE
(loc.)
Plan horizontal de référence passant par les points Condyliens et le point Infra-Orbitaire (gauche par convention).

PLAN D'OCCLUSION
(loc.).
Plan, défini à la mandibule, les arcades étant en occlusion, passant par deux références dentaires postérieures et une antérieure. En prothèse, les références sont les pointes des cuspides disto-vestibulaires des deuxièmes molaires et le bord libre des incisives. En céphalométrie, c'est une droite qui coupe les milieux de !'engrènement cuspidien des premières molaires et du recouvrement incisif.
Angl. : OCCLUSAL PLANE

PLAN DE CAMPER
(loc.)
Plan d'orientation horizontale crânio facial passant par les Tragions et le point Sous-Nasal.
Angl. : CAMPER'S LINE, CAMPER'S PLANE

PLAN DE FRANCFORT
(loc.)
Plan crânien d'orientation horizontale passant par les Tragions et le point Infra Orbitaire [gauche par convention)
N.B. : Historiquement, plan d'orientation horizontale crânien passant par les Porions (bord supérieur des méats acoustiques) et le point Infra-Orbitaire gauche (définition d'un plan osseux adoptée au Congrès International des Anthropologues à Francfort en 1884). Il correspond à l'orientation de la tête quand le regard se porte à l'horizon, en position orthostatique.
Angl. : FRANKFORT'S HORIZONTAL PLANE

PLAN OCCLUSO-CORONAIRE
(loc.)
Plan horizontal caractérisant l'inclinaison de la table occlusale, le plus souvent perpendiculaire au grand axe corono-radiculaire de la dent
N.B. : Préférable à « plan de la table occlusale ».
Angl. : OCCLUSO-CORONAL PLANE

POINT D'ÉMERGENCE (de l'axe charnière)
(loc.)
Point matérialisant la projection cutanée de l'axe charnière. Il se localise par méthode géométrique (statistique), anatomique (palpation) ou cinématique (condylographe).
Angl. • CONDYLAR POINT

SIMULATEUR (de mouvements mandibulaires)
(loc.) Etymol. : du latin simulare = faire paraître.
Dispositif visant à reproduire les mouvements mandibulaires. On distingue l'occluseur et l'articulateur.
Angl. : S!MULATOR

TABLE INCISIVE
(loc.) Etymol.: du latin tabula= planche et incisus, de incidere = entailler, couper.
Partie de l'articulateur recevant la tige incisive. Elle peut-être plane, orientable ou individualisée. Elle participe à la simulation des mouvements mandibulaires.
Angl. : INCISAL OR ANTERIOR GUIDE TABLE

TIGE INCISIVE
(loc.) Etymol. : du latin pop. tibia = tige et incisus, de incidere = couper.
Partie antérieure de l'articulateur permettant le réglage de la Dimension Verticale d'Occlusion (D.V.O.) et pouvant guider les déplacements relatifs des branches de l'articulateur.
Angl. : INCISAL OR ANTERIOR GUIDE PIN

TRIANGLE DE BONWILL
(!oc.)
Triangle virtuel de 4 pouces (101,6 mm) de côté ayant pour sommets les deux condyles mandibulaires (pôles latéraux) et l'incision mandibulaire.
Angl. : BONWILL'S TRIANGLEww

MORPHOLOGIE DENTAIRE

ANGLE CUSPIDIEN

Voir « Pente cuspidienne

Angl. : CUSPANGLE

ANGLE CUSPIDIEN ABSOLU

Voir « Pente cuspidienne absolue »

Angl. : EFFECTIVE CUSPANGLE

ANGLE CUSPIDIEN RELATIF

Voir « Pente cuspidienne relative»

Angl. : RELATIVE CUSPANGLE

ARÊTE CUSPIDIENNE

(loc.) Elymol.: latin arista = épi barbe des céréales, pointe de l'épi et cuspis, cuspidis = tout objet pointu.

Ensemble des points culminants délimitant les deux pans d'un versant cuspidien.

Angl. : CUSP RIDGE



ARTICULATION DENTO-DENTAIRE

(loc.)

Rapport cinématique des contacts entre les dents antagonistes.

Angl. : DENTAL OCCLUSION

ARTICULÉ DENTAIRE

Voir « Articulation dento-dentaire »

BORD INCISIF

(loc.)

Portion occlusale des incisives pouvant affronter les incisives antagonistes clans une action sécante.

N.B. Le bord incisif est également dénommé bord libre

Angl. : INCISAL EDGE

CINGULUM

(n.m.) Etymol. : du latin cingula = ceinture, sangle.

Tubercule situé sur la face linguale des incisives et des canines.

Angl. : CINGULUM



CONTACT OCCLUSAL

(loc.)

Zone de contact entre deux dents antagonistes.

Angl. : OCCLUSALCONTAC

CONTACT PROXIMAL (point de)

(loc.) Etymol.: du latin contactus = qui se touchent, proximus = le plus proche et punctum = point.

Zone de contact proximal (point ou surface) entre deux dents adjacentes.

Angl. : INTERPROXIMALCONTACT



CRÊTE CUSPIDIENNE

(loc.) Etymol.: du latin crista = crête, de crescere= croître et cuspis, cuspidis = pointe.

Ensemble des points culminants formés par la rencontre des deux versants d'une même cuspide.

N.B. • La ligne des crêtes (cuspidiennes et marginales) délimite la table occlusale.

Angl.. : CUSP RIDGE



CRÊTE MARGINALE

(loc.) Etymol. : du latin crisla = crête, de crescere= croître et margo, marginis = marge, bord.

Éminence allongée à orientation vestibulo-linguale située sur les bords proximaux de la face occlusale des dents pluri-cuspidées et, par analogie, de la face linguale des incisives et canines.

Angl. : MARGINAL RIDGE



CUSPIDE

(n.f.) Etymol. : du latin cuspis, cuspidis = pointe.

Éminence constituant la pointe des canines (dents mono-cuspidées) ou située sur la face occlusale des molaires et prémolaires (dents pluri-cuspidées)

Angl. : CUSP



CUSPIDE D'APPUI
(loc.)
Cuspide qui entretient des contacts antagonistes par ses deux versants.
Syn. Cuspide support.
N.B. Généralement cuspides vestibulaires à la mandibule, cuspides linguales au maxillaire.
Angl. : SUPPORTING CUSP



CUSPIDE GUIDE
(loc.) Etymol. : du latin cuspis, cuspidis = pointe ; de l'ancien français guier, guidare = montrer une direction.
Cuspide qui entretient des contacts antagonistes par son seul versant interne.
N.B. Généralement cuspides vestibulaires au maxillaire et cuspides linguales à la mandibule.
Angl. : GUIDING CUSP



CUSPIDE SUPPORT
(loc.)
Syn. Cuspide d'appui.
Angl. : SUPPORTING CUSP

CUSPIDÉ(E)
(adj.)
Qui présente une ou plusieurs cuspide(s).
N.B. : Canine, prémolaire et molaire.
Angl. : CUSPED

FACE DISTALE
(loc.) Etymol. : du latin facies= face et distare = être éloigné.
Face dentaire axiale normalement la plus éloignée du point inter-incisif.
Angl. : DISTAL

FACE LINGUALE
(loc.) Etymol. : du latin facies= face et lingua = langue
Face dentaire axiale située normalement du côté de la langue.
N.B. Préférable à face palatine pour les dents maxillaires.
Angl. : LINGUAL

FACE MÉSIALE
(loc.) Etymol. : du latin facies = face ; du grec mesos= au milieu, dans l'intervalle.
Face dentaire axiale normalement la plus proche du point inter-incisif.
Angl. : MESIAL

FACE OCCLUSALE
(loc.) Etymol. : du latin facies= face et occlusus, de claudere = fermer.
Face des dents pluri-cuspidées délimitée par la ligne de plus grand contour, s'affrontant normalement avec celles des dents antagonistes.
N.B. : Synonyme préférable à face triturante. Ne pas confondre avec « Table occlusale ».
Angl. : OCCLUSAL



FACE PALATINE
Voir « Face linguale »
Angl. : PALATAL

FACE PROXIMALE
(loc.l Etymol. : du latin facies = face et proximus = proche.
Face dentaire axiale désignant aussi bien la face mésiale que la face distale.
Angl : PROXIMAL

FACE TRITURANTE
Voir « Face occlusale)>
Angl. : OCCLUSAL

FACE VESTIBULAIRE
(loc.l Etymol. : du latin facies= face et vestibulum = entrée.
Face dentaire axiale située normalement en regard du vestibule.
Angl. : BUCCAL

FOSSE OCCLUSALE
(loc.) Etymol.: du latin fodere = creuser, fouir et occlusus, de claudere = fermer.
Zone de convergence de plusieurs sillons principaux délimitée par au moins trois cuspides.
Angl. : CENTRAL FOSSA

FOSSETTE MARGINALE
(loc.) Etymol.: du latin fossula, de fovea = diminutif de fosse, et margo, marginis = bord, marge.
Zone de convergence du sillon principal et des sillons marginaux.
Angl. : TRIANGULAR FOSSA



HAUTEUR CUSPIDIENNE
(loc.) Etymol. : du latin altus, de alere= faire grandir et cuspis, cuspidis = pointe.
Projection verticale entre la pointe cuspidienne et le sillon principal d'une dent.
Angl. : CUSP HE!GHT



INCISURE
(loc.) Etymol. : du latin incisus, de incidere = couper.
Légère dépression séparant deux lobules incisifs.

LIGNE DE PLUS GRAND CONTOUR
(loc.).
Ligne reliant les points les plus saillants de la couronne d'une dent par rapport à son grand axe.
Angl. : HEIGHT OF CONTOUR

LOBE CUSPIDIEN
(loc.) Etymol. : du grec lobos= petite protubérance arrondie, spécialement à la base de l'oreille, et latin cuspis, cuspidis = pointe
Convexité délimitée par des sillons secondaires du versant interne d'une cuspide.
N.B. Chaque versant occlusal est scindé par les sillons secondaires en un lobe médian et des lobes latéraux (A. Lautrou).
Angl. : CUSP MAMELON



LOBULE INCISIF
(l oc.) Etymol. : du latin lobulus = petit lobe et incisus de incidere = couper.
Protubérance arrondie et distincte, dessinant le bord libre des incisives. Au nombre de deux ou plus, ils sont séparés par une incisure.

PAN CUSPIDIEN
(n.m.)
Chacune des quatre faces d'une cuspide.
N.B. : Un versant cuspidien est composé de deux pans séparés par une arête.
Angl. : CUSP SLOPE



POINT DE CONTACT
(loc.)
Terme impropre.
Voir « Contact proximal ».
Angl. : CONTACTING SURFACE

POINTE CUSPIDIENNE
(loc.)
Sommet d'une cuspide.
Angl. : CUSP TIP



SILLON DENTAIRE
(!oc.)
Dépression située sur une surface dentaire.
N.B. : On distingue des sillons principaux les plus marqués, des sillons secondaires et des sillons marginaux (A. Lautrou).
Angl. : DEVELOPMENTAL GROOVE

SILLON MARGINAL
(loc.)
Sillon situé à l'intersection d'un pan cuspidien et d'une crête marginale.



N.B. : Certaines dents présentent un sillon marginal séparant la crête marginale en lobes marginaux. Il est dit : sillon marginal accessoire (A. Lautrou).
Angl. : DEVELOPMENTAL GROOVE

SILLON PRINCIPAL
(loc.)
Sillon situé à l'intersection de deux cuspides.
N.B. : Il existe un sillon central (à direction mésio-distale) et des sillons périphériques (à direction vestibulo-linguale) (A. Lautrou).
Angl. : CENTRAL DEVELOPMENTAL GROOVE



SILLON SECONDAIRE
(loc.)
Sillon séparant les versants cuspidiens en lobes cuspidiens.
N.B. : Issus du sillon principal, les sillons secondaires remontent sur les versants cuspidiens en s'affinant et, fréquemment, en se ramifiant à leurs extrémités. Chaque versant occlusal est alors scindé en un lobe médian et des lobes latéraux (A. Lautrou).
Angl. : OBLIQUE DEVELOPMENTAL GROOVE



SILLON DE STUART
(loc.)
Sillon prothétique artificiel situé sur le pan mésio-lingual de la cuspide mésiale de la première molaire maxillaire, correspondant à la trajectoire de la cuspide antagoniste au cours d'un mouvement de diduction.
Angl. : STUART'S GROOVE



TABLE OCCLUSALE
(loc.) Etymol.: du latin tabula = planche et occlusus, de claudere = fermer.
Surface délimitée par les lignes des crêtes cuspidiennes et marginales.
Angl. : OCCLUSAL TABLE



TUBERCULE DENTAIRE
(loc.) Etymol. : du latin tuberculurn. diminutif de tuber = tumeur.
Éminence coronaire inconstante, linguale ou vestibulaire, non occlusale.
N.B. : Le tubercule de Bolk est situé sur la face vestibulaire des deuxièmes molaires mandibulaires. Le tubercule de Carabelli est situé sur la partie mésiale de la face linguale de la première molaire maxillaire.
Angl. : CUSP OR DENTAL TUBERCLE

VERSANT CUSPIDIEN
(loc.) Etymol.: du latin vertere = tournet, et cuspis, cuspidis = pointe.
Ensemble de deux pans cuspidiens ayant une orientation commune : occlusale (interne), vestibulaire ou linguale (externe).
N.B. : Le versant est dit « interne » lorsqu'il est inscrit à l'intérieur de la ligne de crête, situé sur la table occlusale.



TERMES IMPROPRES OU OBSOLÈTES

CONDYLE TEMPORAL
(loc.l Etymol. : du grec kondulos = proéminence osseuse, du latin temporalis = de la tempe.
Terme impropre,
Voir « Tubercule articulaire ».
Syn. Éminence articulaire (terme impropre).
Angl. : ARTICULAR EMINENCE

CORONÉ
Voir « Processus coronoïde »

DYSFONCTIONNEMENTS DE L'APPAREIL MANDUCATEUR (DAM) (def.2025)
Etymol. :préfixe grec dis=de façon défectueuse + latin functio= accomplissement + apparatus= dispositif + manducare = manger.
Terme obsolète : voir Dysfonctionnements TemporoMandibulaires

ÉMINENCE TEMPORALE
Voir « Tubercule articulaire »

INCISION MANDIBULAIRE (point)
(loc.) Etymol. : du latin incisus, de incidere = entailler, couper.
Point inter-incisif mandibulaire occlusal et médian.

MÉNISQUE
(n.m.)
Voir « Disque articulaire »
Angl. : MENISCUS

SYNDROME ALGO-DYSFONCTIONNEL DE L'APPAREIL MANDUCATEUR (S.A.D.A.M.)
Voir « Dysfonctionnement de l'appareil manducateur » (D.A.M.)
Angl. : TEMPOROMANDIBULAR JOINT SYNDROME

SYNDROME DE COSTEN
Voir « Dysfonctionnement de !'appareil manducateur » (D.A.M.)
Angl. ; COSTEN'S SYNDROME

TÊTE CONDYLAIRE
Voir « Condyle mandibulaire »

ORGANISATION DES ARCADES

COURBE DE SPEE
(loc.)
Courbe sagittale à concavité supérieure issue du sommet de la cuspide de la canine mandibulaire et qui suit la ligne des pointes cuspidiennes vestibulaires des prémolaires et molaires mandibulaires.
Angl. : CURVE OF SPEE



COURBES DE WILSON
(loc.)
Courbes frontales à concavité généralement supérieure réunissant les sommets des cuspides vestibulaires et linguales de deux dents homologues.
Angl : WILSON CURVES



DENTALÉ

Voir « Incision mandibulaire »

Angl. : DENTALE

EMBRASURE

(loc.)

Espace compris entre les faces proximales de deux dents adjacentes.

N.B. On distingue quatre embrasures {gingivale, occlusale, vestibulaire et linguale), convergentes au (point de) contact proximal.

Angl. : EMBRASURE



ESPACE INTER-OCCLUSAL DE REPOS

(loc.)

Différence de hauteur entre la dimen sion verticale de repos (D.V.R.) et la dimension verticale d'occlusion (D.V.O.).

Angl. : INTEROCCLUSAL REST SPACE

ESPACE LIBRE DE THOMPSON

Voir « Espace inter-occlusal de repos »

Angl. : THOMPSON'S FREEWAY SPACE

FONCTION OCCLUSALE

(loc.) Etymol. du latin functio = accomplissement et occlusus, de claudere = fermer.

Conditions physiologiques de l'affrontement des arcades dentaires.

Angl : OCCLUSAL FUNCTION

INFRACLUSIE

Voir « Infraclusion »

Angl. : INFRACLUSION

INFRACLUSION

(n.f.) Etymol. : du latin infra= au-dessous et occlusus, de claudere = fermer.

Inocclusion postérieure ou recouvrement antérieur insuffisant.

Syn. Infraclusie.

Angl. : INFRACLUSION

INOCCLUSION

(n.f.) Etymol.: du latin in = privé et occlusus, de claudere = fermer.

Absence de contact occlusal.

INTERCUSPIDATION

(n.f.) Etymol. : du latin inter= entre et cuspis, cuspidis = pointe.

Aspects dynamiques des rapports qui s'établissent entre faces occlusales antagonistes.

Angl. : INTERCUSPATION

INTERCUSPIDIE

(n.f.) Etymol. : du latin inter = entre et cuspis, cuspidis = pointe.

Rapport inter-dentaire établi par l'intercuspidation.

Angl. : INTERCUSPAL POSITION

RECOUVREMENT

(n.m.)

Projection dans le plan vertical de la distance entre les bords libres des incisives mandibulaires et maxillaires en Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.).

N.B. : Par extension, cette notion de recouvrement peut s'appliquer aux dents cuspidées : projection dans le plan vertical de la distance entre les sommets cuspidiens mandibulaires et maxillaires.

Angl. : OVERB!TE



SURPLOMB

(n.m.) Etymol.: de l'ancien provençal sobre-plomber = sommet de la ligne de l'aplomb.

Projection dans le plan horizontal de la distance entre les bords libres des incisives mandibulaires et maxillaires en Occlusion d'Intercuspidie Maximale (O.I.M.)

N.B. : Par extension, cette notion de surplomb peut s'appliquer aux dents cuspidées : projection dans le plan horizontal de la distance entre les sommets cuspidiens mandibulaires et maxillaires.

Angl. : OVERJET



A CLASSER

DENTITION
(loc.) Etymol. : du latin dentitio, de dens, dentis = dent.
Ensemble des phénomènes de développement des arcades dentaires : origine, minéralisation, croissance, éruption, vieillissement des dents.
N.B. L'homme possède deux dentitions. Il est diphyodonte.

DENTURE
(loc.)
Ensemble des dents présentes dans la cavité buccale à un moment donné.
Angl. : DENTITION (NATURAL)

DENTURE MIXTE
(loc.)
État de la denture au cours du développement normal des arcades dentaires se caractérisant par la présence simultanée de dents temporaires et de dents permanentes.
Angl. : MIXED DENTITION

OCCLUSODONTIE
(n.f.) Etymol. : du latin occlusus, de claudere = fermer ; du grec odous, odontos = dent.
Pratique clinique et para-clinique de l'occlusodontologie : ensemble des techniques diagnostiques ou thérapeutiques visant à l'évaluation et/ou à l'optimisation fonctionnelle de l'appareil manducateur.

OCCLUSODONTOLOGIE
(n.f.) Etymol.: du latin occlusus, de claudere = fermer; du grec odous. odontos = dent et logos = science.
Ensemble des connaissances traitant dans le cadre de l'appareil manducateur, des interrelations fonctionnelles ou dysfonctionnelles dento-neuro-musculo-articulaires.

SIGNE
(n.m.) Etymol. : du latin signum = signe.
Manifestation d'une maladie permettant d'aider à la définir et à la reconnaître.
N.B. : C'est un phénomène, le plus souvent reproductible, objectivement décelable par un observateur. Il peut être spontané ou provoqué à des fins diagnostiques.
Angl. : SIGN

SYMPTOME
(n.m.) Etymol.: du grec sun = avec et piptein = tomber, échoir, arriver, survenir.
Manifestation pathologique subjective ou objective perçue par le patient.
Angl. : SYMPTOM

VISAGE
(n.m.) Etymol.: du latin visus = ce qui est donné à voir, ce qui s'offre à la vue, aspect.
Partie antérieure de la tête située entre la ligne d'insertion antérieure des cheveux et le Gnathion. Elle se compose de trois étages dont les deux inférieurs constituent la face.
Angl. : FACE

PERSONNALITÉS

ANGLE E.H.
(NB) J Edward Hartley Angle : orthodontiste américain (1855-19301)
Voir « Classification d'Angle » (1898)

BALKWILL F.H.B.
(N.) Chirurgien dentiste anglais (1837- 1912)
Voir « Gnathogramrne de Balkwill »

BALLARD C.S.
(N.) Chirurgien dentiste américain.
Voir « Classification de Ballard »

BENNETT N.G.
(N.) Norman G. Bennett : chirurgien-dentiste anglais (1870-1947)
Voir « Angle de Bennett » et « Mouvement de Bennett »

BONWILL W.G.A.
(N.) Williams Gibson Arlington Bonwill : chirurgien-dentiste américain (1833-1899)
Voir « Triangle de Bonwill »

BROCA P.
(N.) Paul Broca : chirurgien français, fondateur de l'anthropologie (1824-1880).
Voir « Plan de Broca »

CAMPER P.
(N.) Pieter Camper : anatomiste hollandais (1722-1789).
Voir « Plan de Camper »

COSTEN J.B.
(N.) J.B. Costen : oto-rhino-laryngologiste américain, (né en 1895).
Voir « Syndrome de Costen »

FERREIN A.
(N.) Antoine Ferrein : anatomiste français, (1693-1769).
Voir « Mouvement de Ferrein »

FISCHER R.F.T.
(N.) Fischer : chirurgien dentiste suisse.
Voir « Angle de Fischer »

GYSI A.
(N.) Alfred Gysi : médecin-dentiste suisse (1865-1957).
Voir « Angle de Gysi », « Arc gothique de Gysi »

LUCIA V.
(N.) Victor Lucia : chirurgien dentiste américain.
Voir « JIG de Lucia »

POSSELT U.
(N.) Ulf Posselt: chirurgien dentiste suédois.
Voir « Diagramme de Posselt »

SPEE F.
(N.I Ferdinand Graf von Spee : anatomiste allemand (1855 -1937)
Voir « Courbe de Spee »

STUART C.

(N.) Charles Stuart : chirurgien dentiste américain.

Voir « Sillon de Stuart »

THOMPSON

(N) Thompson J R : chirurgien dentiste américain.

Voir « Espace libre de Thompson »

WILSON G.H.

(N.) Georges Henri Wilson : chirurgien dentiste américain (1855-1922).*Voir « Courbes de Wilson »*

Liste des abréviations utilisées

adj.	adjectif
Angl.	anglais (terme)
Etymol.	étymologie
loc.	locution
N.	nom propre
n.m.	nom masculin
n.f.	nom féminin
Syn.	Synonyme

Liste des personnalités citées

Angle E.H.
Balkwill F.H.B.
Ballard C.S.
Bennett N.G.
Bonwill W.G.A.
Broca P.
Camper P.
Costen J.B.
Ferrein A.
Fischer R.F.T.
Gysi A.
Lautrou A.
Lucia V.
Mc Harris W.
Posselt U.
Spee F.
Stuart C.
Thompson J.R.
Wilson G.H.

Commentaire (2001)

L'occlusion au sens le plus large du terme — des contacts dento-dentaires aux dysfonctionnements temporo-mandibulaires – est une discipline dont l'apparent obscurantisme est essentiellement lié à une terminologie imprécise ou mal définie. Le mérite du Collège National d'Occlusodontologie est de s'être aussi penché sur cet aspect essentiel de la compréhension et de la communication.

Lancée en 1988, cette compilation terminologique a réellement évolué depuis la création d'un groupe de travail chargé d'organiser et de mener à terme un ouvrage de référence.

Pendant de nombreuses années cette Commission de Terminologie du CNO a donc travaillé pour réunir, discuter, expliquer et formaliser, dans un esprit de consensus, le langage utilisé pour exprimer le rôle essentiel de l'appareil manducateur et de ses constituants : les fonctions.

La commission est composée de membres universitaires ou non, ayant chacun une orientation professionnelle différente et des compétences complémentaires. De ce fait, les définitions des termes analysés s'inscrivent dans une cohérence odontologique et médicale aujourd'hui indispensable.

S'appuyant sur les références scientifiques internationales les plus récentes et les bases lexicologiques nécessaires, les termes utilisés furent d'abord classés par domaines de connaissances (anatomie, mouvements mandibulaires, pathologie, etc.), puis discutés, révisés et finalement adoptés par l'ensemble des membres de la commission. Ceux-ci sont à l'origine des recherches bibliographiques et documentaires qui donnent à ce lexique sa valeur scientifique.

Le résultat est un recueil des termes utilisés, clairement définis, illustrés de schémas explicatifs simples. Un ouvrage indispensable pour préciser ses connaissances et affirmer son savoir.

Les membres de la Commission de Terminologie souhaitent exprimer leur reconnaissance à Évelyne BATAREC, auteur d'un « Lexique des termes de prothèse » et membre initial de la commission, pour sa contribution et son soutien à la réalisation de cet ouvrage.